


Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
ACTOS 15 mg	1.019.874	comprimé	Pioglitazone	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
ACTOS 30 mg	1.020.029									
ADCIRCA 20 mg	1.057.034	comprimé pelliculé	Tadalafil	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
ADEMPAS 0,5 mg	1.056.302	comprimé pelliculé	Riociguat	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
ADEMPAS 1 mg	1.056.303									
ADEMPAS 1,5 mg	1.057.919									
ADEMPAS 2 mg	1.058.030									
ADEMPAS 2,5 mg	1.058.160									
ADIAZINE 500 mg	0.000.015	comprimé	Sulfadiazine	Oui Avec masque et gants	Oui Avec masque et gants		OUI	Goût amer peut être mélangé à un aliment (yaourt, purée, jus de fruit)		Pendant ou en dehors des repas
ADVAGRAF 0,5 mg	1.041.210	gélule à libération prolongée	Tacrolimus			Oui Sans écraser les microgranules	OUI	Mettre les microgranules dans environ 50 mL d'eau et rincer la tubulure avec 20-30 mL d'eau Ne pas utiliser la sonde Salem-PVC	Prograft gélule Séparer la dose totale en 2 prises identiques à 12 h d'intervalle	A jeun ou au moins 1 heure avant ou 2 à 3 heures après un repas Interrompre la nutrition entérale 30 min avant et après l'administration
ADVAGRAFT 1 mg	1.041.211									
AFINITOR 5 mg	1.051.134	comprimé	Évérolimus	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
AFINITOR 10 mg	1.044.696									
AKINETON 2 mg	0.000.020	comprimé	Bipéridène	Oui	Oui		OUI			Pendant ou après le repas
AKINETON Retard 4 mg	1.039.732	comprimé à libération prolongée	Bipéridène	Oui	Non		NON		Akineton 2 mg en adaptant le rythme d'administration	Pendant ou après le repas
AKYNZEO 300/0,5 mg	1.063.658	gélule	Netipitant + Palonosetron			Non	NON		Autres antiémétiques : Emend + Ondansétron	Au cours ou en dehors du repas
ALDOMET 250 mg	0.000.031	comprimé enrobé	Méthylodopa sesquihydrate	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière Mélanger la poudre à un aliment		Pas de données
ALECENSA 150 mg	1 064 480	gélule	Alectinib chlorhydrate			Non	NON			Pendant le repas
ALENDRONATE EG 70 mg	1.059.912	comprimé	Acide alendronique	Non	Oui Uniquement si administration par sonde		OUI	Principe actif irritant pour les muqueuses buccale et oesophagienne		30 min avant ou 2 h après le petit-déjeuner, avaler avec de l'eau du robinet, rester en position assise le temps de l'administration Si sonde : arrêter la nutrition entérale pendant au moins 30 min avant et après l'administration
ALLOPURINOL Teva 100 mg	1.084.440	comprimé sécable	Allopurinol	Oui	Oui		OUI	Dispersible dans l'eau		Après le repas
ALLOPURINOL EG 300 mg	1.057.327									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
ALOXI 500 µg	1.057.623	capsule molle	Palonosétron		Non		NON		Emend 125 mg	1 heure avant la chimiothérapie
ALUNBRIG 180 mg	1 079 877	comprimé pelliculé	Brigatinib	Non	Non		NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse		Pendant ou en dehors des repas
ALVITYL VITALITE	1.044.438	comprimé enrobé	Vitamine A, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B3 (PP), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B8, Vitamine B9, Vitamine B12, Vitamine C, Vitamine D3, Vitamine E, Zinc, Fer, Magnésium, Cuivre, Manganèse, Molybdène, Sélénium; Mélange de vitamines		Oui		OUI	A utiliser immédiatement car les vitamines sont sensibles à la lumière et se dégradent rapidement Enrobage : masque le goût car les vitamines sont amères Préférer alternative	Alvityl sirop (sur ordonnance)	Pas de données
AMIZAL 45 mg	1 079 472	comprimé enrobé	Idébénone	Non	Non		NON			Au cours d'un repas
AMLODIPIN Sandoz 5 mg	1.059.902	comprimé	Amlodipine	Oui	Oui		OUI	Ajouter beaucoup de liquide car peu soluble (risque d'obstruction de la sonde)		Pendant ou en dehors des repas
AMLOR 5 mg	0.000.043	gélule	Amlodipine			Oui	OUI			Pas de données
ANAFRANIL 25 mg	0.000.057	comprimé pelliculé	Clomipramine chlorhydrate	Non	Oui		OUI	Dispersible dans l'eau		Pas de données
ANAFRANIL RETARD 75 mg	0.000.058	comprimé pelliculé sécable à libération prolongée		Oui	Non		NON	Anafranil cp à 25 mg en répartissant la dose des comprimés retard en 3 administrations par jour ou Anafranil 25 mg/2 mL voie IV (sur ordonnance)		
ANASTROZOLE EG 1 mg	1.059.908	comprimé pelliculé	Anastrozole	Non	Oui Avec masque et gants		OUI	Ne pas faire manipuler les femmes enceintes		Pas de données
ANDROCUR 50 mg	1.010.520	comprimé sécable	Cyprotérone acétate	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI			Après le repas
ANGUSTA 25 µg	1.075.131	comprimé	Misoprostol	Non			NON			Pas de données
APRANAX 550 mg	1.014.256	comprimé pelliculé bisécable	Naproxène	Oui	Oui		OUI			Avant ou après les repas
APROVEL 150 mg	1.005.743	comprimé pelliculé	Irbesartan	Oui	Oui		OUI			Pas de données
APTIVUS 250 mg	1.033.261	capsule	Tipranavir	Non	Non		NON			En présence de nourriture
ARCOXIA 60 mg	1.028.234	comprimé pelliculé	Etoricoxib	Non	Oui		OUI	Principe actif sensible à l'humidité de l'air		Pendant ou en dehors des repas si effet rapide nécessaire donner en dehors des repas
ARCOXIA 90 mg	1.028.099									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
ARIPRIPAZOLE EG 10 mg	1.066.372	comprimé	Aripiprazole	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pendant ou en dehors des repas
ARIPRIPAZOLE EG 15 mg	1.066.373									
AROMASIN 25 mg	1.039.415	comprimé enrobé	Exemestane	Non	Non		NON			Après un repas
ASAFLOW 80 mg	1.013.379	dragée avec enrobage entérique	Acide acétylsalicylique		Non (sauf si sonde entérique)		OUI	Préférer alternative	Aspegic 100 mg sachet	Pas de données
ASPEGIC 100 mg	0.000.081	Sachet	Acétylsalicylate de lysine				OUI	Diluer la poudre dans l'eau, du lait ou du jus de fruit		Pas de données
ASPEGIC 500 mg	0.000.082									
ASTONIN H 0,1 mg	0.000.084	comprimé	Fludrocortisone	Oui	Oui		OUI			Après le repas
ATARAX 25 mg	0.000.086	comprimé pelliculé sécable	Hydroxyzine	Oui	Oui		OUI	Goût amer	Atarax sirop 2 mg/mL (contient de l'éthanol)	Pas de données
ATENOLOL EG 50 mg	1.049.444	comprimé pelliculé sécable	Atenolol	Oui	Oui		OUI			Pas de données
ATORVASTATINE EG 10 mg		comprimé pelliculé	Atorvastatine	Non	Oui		OUI			Avec ou sans nourriture
ATORVASTATINE EG 20 mg										
ATORVASTATINE EG 80 mg										
AUGMENTIN 500/125 mg	0.000.095	Sachet	Amoxicilline / acide clavulanique	Oui (uniquement pour faciliter la prise = Barre de confort)	Oui Avec masque et gants		OUI	Barre de cassure ne divise pas en deux le comprimé		En début de repas
AUGMENTIN 875/125 mg	1.015.089	comprimé pelliculé sécable								
AVODART 0,5 mg	1.033.300	capsule molle	Dulasteride			Non	NON	Le contact avec le contenu des capsules peut causer une irritation de la muqueuse oropharyngée	Proscar 5 mg (peut être écrasé mais ne pas faire manipuler femme enceinte car tératogène) Manipulation avec masque et gants	Au cours ou en dehors des repas
AXURA 10 mg	1.020.017	comprimé sécable	Mémantine	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
AZILECT 1mg	1.035.705	comprimé	Rasagiline	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
BACTRIM FORTE 800/160 mg	0.000.109	comprimé sécable	Cotrimoxazole (sulfaméthoxazole / triméthoprime)	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI		Bactrim sirop 200/40 mg/5 mL contient du sorbitol Sonde : Diluer le sirop 3 à 5 fois au préalable (osmolalité élevée)	Après les repas
BEFACT FORTE	0.000.117	dragée	Vitamines B1-B2-B6-B12	Non	Oui		OUI	Utilisation immédiate car dégradation rapide des vitamines Enrobage = masque le goût		Pendant le repas
BELSAR 20 mg	1.032.606	comprimé pelliculé	Olmesartan medoxomil	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
BENERVA 300 mg	0.000.120	comprimé gastro-résistant	Vitamine B1 ou Thiamine	Non	Non		NON		Utilisation voie IV	Pendant le repas
BETAHISTINE TEVA 8 mg	1.084.442	comprimé		Non						

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
BETAHISTINE TEVA 16 mg	1.084.441	comprimé sécable	Betahistine	Oui	Oui		OUI	Soluble dans l'eau		Pas de données
BETMIGA 50 mg	1.055.877	comprimé à libération prolongée	Mirabegron	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
BICALUTAMIDE EG 50 mg	1.049.416	comprimé pelliculé	Bicalutamide		Oui Avec masque et gants		OUI	Ne pas faire manipuler les femmes enceintes Administration immédiate après mise en suspension car risque de formation de cristaux		Avant ou pendant ou en dehors des repas
BICANORM 1 g	1.044.595	comprimé gastro-résistant	Bicarbonate de sodium	Non	Non		NON			Pas de données
BIKTARVI 50/200/25 mg	1.070.270	comprimé pelliculé	Bictegravir + Emtricitabine + Tenofovir fumarate		Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
BISOPROLOL EG 2,5 mg	1.059.757	comprimé sécable	Bisoprolol hémfumarate	Oui	Oui		OUI	Goût amer Peu soluble dans l'eau		Avant ou pendant le petit déjeuner
BISOPROLOL EG 5 mg	1.059.758									
BOSULIF 100 mg	1 068 597	comprimé pelliculé	Bosutinib	Non	Non		NON			Pendant le repas
BOSULIF 400 mg	1 075 240									
BRAFTOVI 75 mg	1 072 525	gélule	Encorafénib			Non	NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse		Pendant ou en dehors des repas
BRILIQUE 90 mg	1.049.906	comprimé pelliculé	Ticagrelor		Oui		OUI	Utilisation immédiate (la firme n'a pas de données une fois le comprimé broyé)	Brilique comprimé orodispersible sur ordonnance	Pendant ou en dehors des repas
BRIVIACT 100 mg	1.060.598	comprimé pelliculé	Brimacetam	Non	Non		NON		Briviact sirop 10 mg/mL sur ordonnance	Pendant ou en dehors des repas
BROMAZEPAM EG 12 mg	1.015.099	comprimé sécable	Bromazépam	Oui	Oui		OUI			Pas de données
BURINEX 1 mg	1.019.297	comprimé	Bumétanide	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pas de données
BURINEX 5 mg	1.019.450									
BUSCOPAN 10 mg	0.000.165	comprimé enrobé	Buthylhyoscine bromure	Non	Oui		OUI	Goût très amer A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière	Buscopan 10 mg suppositoire ou ampoule de 20 mg/mL injectable	Pas de données
BUSPIRONE SANDOZ 10 mg	1.063.955	comprimé sécable	Buspirone HCl	Oui	Oui		OUI	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse		Pas de données
CABOMETYX 20 mg	1 064 479	comprimé pelliculé	Cabozantinib	Non	Non		NON			A jeun au moins 1h avant ou 2h après mangé
CABOMETYX 40 mg	1 064 433		Cabozantinib							

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
CABOMETYX 60 mg	1 064 069		Cabozantinib							
CALCIUMACETAT 500 mg	1.039.554	comprimé à macher	Calcium acétate 500mg (= calcium 126 mg)	Non	Non		NON	Bien mâcher les comprimés et les avaler avec un peu d'eau		Pendant les repas
CALCI-CHEW 500 mg	1.019.627	comprimé à macher	Calcium carbonate 500 mg (= calcium 500 mg)		Oui		Oui	Broyer le comprimé ou si possible le faire croquer		Pendant les repas
CALCIUM HEXAL 1 g	1.065.264	comprimé effervescent	Calcium gluconolactate-calcium carbonate		Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans un verre d'eau		En dehors ou au cours des repas
CALMDAY 5 mg	1.018.913	comprimé enrobé	Nordazépam	Non	Oui		OUI			1 heure avant le coucher
CALQUENCE 100 mg	1.079.001	gélule	Acalabrutinib			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas
CAMPRAL 333 MG	0.007.086	comprimé gastro-résistant	Acamprosate	Non	Non		NON			En dehors des repas
CANDESARTAN EG 16 mg	1.055.020	comprimé sécable	Candesartan cilexétel	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
CAPTOPRIL EG 25 mg	1.068.236	comprimé sécable	Captopril	Oui	Oui		OUI			Pas de données
CATAPRESSAN 150 µg	0.000.194	comprimé sécable	Clonidine chlorhydrate	Oui	Oui		OUI			Pas de données
CECENU-LOMUSTIN 40 mg	1.051.059	gélule	Lomustine			Non	NON			De préférence le soir ou 3 h après un repas
CEFADROXIL MYLAN 500 MG	1.070.980	gélule	Cefadroxil			Oui Avec masque et gants	OUI	Contenu de la gélule écrasable		Avant ou pendant le repas
CELEBREX 200 mg	1.018.440	gélule	Célécoxib			Oui	OUI			Pendant ou en dehors des repas
CELLCEPT 500 mg	0.007.087	comprimé pelliculé	Mycophénolate mofétel	Non	Non		NON	Ne pas écraser car effet tératogène Si administration par sonde CH > 8F Suivre les taux plasmatiques	Cellcept suspension buvable 1 g/5 mL	En dehors des repas
CESENTRI 150 mg	1.040.179	comprimé pelliculé	Maraviroc		Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
CESENTRI 300 mg	1.043.726									
CERDELGA 84 mg	1 063 372	gélule	Eliglustat tartrate			Non	NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse		Pendant ou en dehors des repas
CIPROFLOXACINE EG 500 mg	1.008.195	comprimé pelliculé sécable	Ciprofloxacine	Oui	Oui Avec masque et		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à	Ciproxine suspension buvable 50 mg/mL (sur ordonnance)	Pendant ou en dehors des repas
CIRCADIN 2 mg	1.044.987	comprimé à libération prolongée	Melatonine	Non	Non		NON	Perte de l'effet retard		Pas de données
CITALOPRAM EG 20 mg	1.053.453	comprimé pelliculé sécable	Citalopram	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
CLAMOXYL 500 mg 	0.000.226	gélule	Amoxicilline			Oui Avec masque et gants	OUI		Clamoxyl sirop 250mg/5mL	Pendant ou en dehors des repas

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
CLARITHROMYCINE EG 500 mg	1.049.448	comprimé pelliculé	Clarithromycine	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI	Très amer	Biclar Kids sirop 250 mg/5 mL	Pendant ou en dehors des repas
CLOPIXOL 2 mg	1.050.212	comprimé pelliculé	Zuclopenthixol	Non	Oui		NON	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière	Clopixol gouttes 20 mg/mL 1 mg/goutte	Pas de données
CLOPIXOL 25 mg	1.019.221									
CLOPIXOL 10 mg	1.015.106									
CLOZAN 5 mg	0.000.235	comprimé sécable	Clotiazepam	Oui	Oui		OUI			En dehors des repas
CLOZAN 10 mg	0.000.234									
COLCHICINE Opocalcium 1mg	0.000.238	comprimé sécable	colchicine	Oui	Oui		OUI	Goût amer peut être mélangé à de la compote		Pendant le repas
COMBIVIR 150/300 mg	1.006.867	comprimé pelliculé sécable	Lamivudine - Zidovudne	Oui	Oui		OUI	Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide, le tout devant être ingéré immédiatement. Préférer alternative	Les principes actifs de COMBIVIR existent séparément sous forme buvable : Epiriv 10 mg/mL et Retrovir 10 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas
COMTAN 200 mg	1.038.602	comprimé pelliculé	Entacapone	Non	Oui		OUI	Peut être mélangé à un aliment semi-solide		Pendant ou en dehors des repas
CORDARONE 200 mg	0.00.246	comprimé sécable	Amiodarone	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en fin de repas
CORTANCYL 1 mg	1.042.242	comprimé	Prednisone	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pendant le repas
CORTANCYL 5 mg	1.027.825	comprimé sécable		Oui						
CORTANCYL 20 mg	1.028.982									
CORUNO 16 mg	1.020.019	comprimé à libération prolongée	Molsidomine	Non	Non		NON	Perte de l'effet retard	Corvaton 2 mg : posologie à adapter	Au cours du petit déjeuner
CORVATON 2 mg	1.044.311	comprimé	Molsidomine	Oui	Oui		OUI			Pas de données
CORVATON Retard 8 mg	1.057.114	comprimé à libération prolongée	Molsidomine	Non	Non		NON		Corvaton 2 mg : posologie à adapter	Pas de données
COTELLIC 20 mg	1 064 307	comprimé pelliculé	Cobimétinib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
COVERSYL 5 mg	1.040.890	comprimé pelliculé sécable	Perindopril arginine	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à l'humidité		Le matin avant le repas
CREON 10 000	1.010.791	Gélule contenant des microgranules gastro-résistants	Pancreatine 150 mg équivalent à Protéase 600 U PhEur - Amylase 8 000 U PhEur - Lipase 10 000 U PhEur			Oui	OUI	Sonde CH>10 F pour ne pas boucher la sonde	Kreon fur Kinder granulé	Avaler le tiers ou la moitié de la dose en début de repas et le restant pendant le repas
CREON 25 000	1.019.163		Pancreatine 500 mg équivalent à Protéase 1000 U PhEur - Amylase							
CRESEMBA 100 mg	1 071 436	gélule	Isavuconazole sulfate			Oui	OUI			Pendant ou en dehors des repas
CRESTOR 10 mg	1.029.597	comprimé pelliculé	Rosuvastatine	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pendant ou en dehors des repas


Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
CRIXIVAN 400 mg	0.006.011	gélule	Indinavir sulfate			Oui Avec masque et gants	OUI	Mélanger la poudre avec un jus		A jeun ou au moins 1 heure avant ou 2 à 3 heures après un repas
CYMBALTA 30 mg	1.039.455	gélule gastro-résistante	Duloxetine			Oui Sans écraser les microgranules	OUI	Si administration par sonde utiliser du jus de pomme pour administrer et rincer la sonde NE PAS UTILISER D'EAU		Pendant ou en dehors des repas
CYMBALTA 60 mg	1.032.996									
CYTOTEC 200 µg	1.010.501	comprimé	Misoprostol	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Au moment des repas ou au coucher
DAFALGAN FORTE 1 g	1.013.744	comprimé effervescent	Paracétamol	Oui			OUI	Dissoudre le comprimé dans de l'eau Pour une administration par sonde : attendre jusqu'à disparition du gaz carbonique pour éviter un reflux gastro oesophagien		Pas de données
DAFALGAN CODEINE	0.000.267	comprimé effervescent	Paracetamol - Codéine							
DAFALGAN ODIS	1.038.782	Comprimé orodispersible	Paracétamol	Non	Non		NON	Laisser fondre sous la langue		Pas de données
DAFLON 500 mg	0.000.268	comprimé pelliculé	Diosmine - Hespéridine		Non		OUI	Soluble dans l'eau		Au cours des repas
DAKLINZA 60 mg	1.057.154	comprimé pelliculé	Daclatasvir		Oui		OUI	Goût désagréable		Pendant ou en dehors des repas
DALACIN C 300 mg	0.000.275	gélule	Clindamycine			Oui Avec masque et gants	OUI	Goût très amer		Pas de données
DAONIL 5 mg	1.018.358	comprimé sécable	Glibenclamide	Oui	Oui		OUI	Goût amer		A administrer au début du repas
DARAPRIM 25 mg	0.000.277	comprimé	Pyriméthamine	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI			Pas de données
DASATINIB TEVA 50 mg		comprimé pelliculé	Dasatinib	Non	Non		Non		Sprycel 10 mg/mL suspension buvable	Pendant ou en dehors des repas
DASATINIB TEVA 70 mg										
DASATINIB TEVA 100 mg										
DEANXIT 10/0,5 mg	1.012.963	dragée	Melitracene - Flupentixol	Non	Oui		OUI			Après le petit déjeuner ou après le déjeuner Pas de prise après 17 h
DEFERASIROX ACCORD 360 mg		comprimé pelliculé	Déférasirox	Non	Oui		OUI	Le comprimé écrasé doit être saupoudré dans une petite quantité de nourriture non solide (ex: yaourt ou compote de pomme)La dose doit être prise immédiatement.		Au jeun ou avec un repas léger
DELSTRIGO 100/300/245 mg	1 074 790	comprimé pelliculé	Doravirine - Lamivudine - Ténofovir	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
DEPAKINE CHRONO 300 mg	0.000.286	comprimé pelliculé sécable	Valproate de sodium	Oui	Non		NON		Dépakine sirop 300 mg/ 5 mL ou Depakine solution buvable 300 mg/mL	Pendant les repas

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
DEPAKINE CHRONO 500 mg	0.000.287	à libération prolongée	valproate de sodium	Oui	Non		NON		Dose bioéquivalente en répartissant la dose totale en 3 ou 4 prises sur la journée	Pendant les repas	
DEPAKINE ENTERIC 300 mg	0.000.288	comprimé gastro-résistant	Valproate de sodium	Non	Non		NON		Dépakine sirop 300 mg/ 5 mL ou Depakine solution buvable 300 mg/mL Dose bioéquivalente en répartissant la dose totale en 3 ou 4 prises sur la journée	Pendant les repas	
DEPAKINE ENTERIC 500 mg	0.000.289										
DEPAMIDE 300 mg	1.046.361	comprimé pelliculé gastro-résistant	Valpromide	Non	Non		NON			Pendant ou en fin de repas	
DESCOVY 200/10 mg	1.061.973	comprimé pelliculé	Emtricitabine + Fumarate tenofovir alafenamide	Non	Oui		OUI			Avec ou sans nourriture	
DESCOVY 200/25 mg	1.061.974	comprimé pelliculé	Emtricitabine + Fumarate tenofovir alafenamide	Non	Oui		OUI			Avec ou sans nourriture	
DESMOPRESSINE 0,2 mg	1.042.513	comprimé	Desmopressine acétate		Oui		OUI			En dehors des repas	
DETRUSITOL 2MG	1.019.459	comprimé pelliculé	Toltérodine tartrate	Non	Oui		OUI			Pas de données mais les aliments n'influencent pas sa biodisponibilité	
DETRUSITOL Retard 4 mg	1.029.145	gélule à libération prolongée	Toltérodine tartrate			Non	NON		Detrusitol 2 mg en répartissant la dose sur la journée	Avec ou sans nourriture	
DEXAMETHASONE 20 mg	1.047.393	gélule	Dexaméthasone			Oui	OUI			De préférence la matin au cours d'un repas	
DEXAMETHASONE 40 mg	1.047.394										
DIABACT UBT 50 mg	1.074.517	comprimé	Urée	Non	Non		NON	si comprimé mâché risque de faux résultats pour détection <i>Helicobacter pylori</i>		A jeun	
DIAMICRON LM 60 mg 	1.049.915	comprimé à libération modifiée sécable	Gliclazide	Oui	Non		NON		Autres hypoglycémisants oraux ou insuline	Au moment du petit déjeuner	
DIAMOX 250 mg 	0.000.300	comprimé quadrisécable	Acétalozamide	Oui (en 4)	Oui		OUI	Goût amer : mélanger à des aliments ou jus de fruit		Pas de données	
DIAZEPAM EG 10 mg	1.060.040	comprimé	Diazepam	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pas de données	
DICLOFENAC RATIO 50 mg	1 044 757	comprimé gastro-résistant	Diclofenac	Non	Non		NON		Diclofenac suppositoire 100 mg ou Diclofenac inj 75 mg/3 mL ou autre AINS	Avant les repas de préférence	

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
DIFICLIR	1.054.972	comprimé pelliculé	Fidaxomicine	Non	Oui Avec masque et gants		OUI			Pendant ou en dehors des repas
DIFLUCAN 50 mg	0.000.306	gélule	Fluconazole			Oui Avec masque et gants	OUI			Pendant ou en dehors des repas
DIFLUCAN 200 mg	1.005.707									
DIPHANTOINE 100 mg	1.003.872	comprimé quadrisécable	Phénytoïne sodique	Oui (en 4)	Oui		OUI	Attention aux imprécisions de dosage au moment de l'écrasement : médicament à marge thérapeutique étroite, risque de sous ou surdosage cliniquement significatif		Pendant les repas MAIS ne pas administrer en même temps que la nutrition entérale: arrêter la nutrition entérale 2 heures AVANT et 2 heures APRES l'administration de la phénytoïne car formation d'un complexe non absorbable entre la diphantoïne et les concentrations plus élevées de Calcium contenu dans la nutrition entérale (Bauer et al. 1982; Brown et al. 1999; Magnuson et al. 2005)
DIPIPERON 40 mg	1.018.956	comprimé	Pipamperone	Oui	Oui		OUI		Dipiperon gouttes 40 mg/mL 1 ml = 40 mg = 20 gouttes	A prendre de préférence le soir et répartie en 2 prises : 1 au repas.
DISTRANEURIN 192 mg	0.000.322	capsule molle	Clométhiazole	Non	Non		NON			Pas de données
DITROPAN 5 mg	1.009.098	comprimé sécable	Oxybutinine	Oui	Oui		OUI			Pas de données
DOGMATIL 50 mg	0.000.325	gélule	Sulpiride			Non	NON			Pas de données
DOMINAL FORTE 80 mg	0.00.335	comprimé sécable	Prothipendyl chlorhydrate	Oui	Oui		OUI	Utilisation immédiate car principe actif très sensible à l'air		Après les repas
DONEPEZIL TEVA 5 mg	1.084.444	comprimé pelliculé	Donepezil chlorhydrate	Non	Oui (goût amer)		OUI			Au coucher
DONEPEZIL TEVA 10 mg	1.084.443									
DOMPERIDONE INSTANT 10 mg	1.084.450	comprimé orodispersible	Domperidone	Non	Non		OUI	Fond directement dans la bouche du patient ou à dissoudre dans un verre d'eau		Avant les repas
DORMONOCT 1 mg	1.015.224	comprimé sécable	Loprazolam	Oui	Oui		OUI			30 minutes avant le coucher
DOSTINEX 0,5 mg	0.000.341	comprimé	Cabergoline	Oui	Oui		OUI			Pendant les repas

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
DOVATO 50/300 mg	1 074 791		Dolutégravir - Lamivudine	Non	Oui Avec masque et gants			Utilisation immédiate		Pendant ou en dehors des repas
DOXYCYCLINE EG 100 mg	1.057.302	comprimé	Doxycycline	Oui Avec masque et gants	Oui Avec masque et gants		OUI			Pendant ou en dehors des repas. Au moins 30 minutes avant le coucher
DULCOLAX 5 mg	0.000.347	comprimé gastro-résistant	Bisacodyl	Non	Oui		OUI	Irritant pour la muqueuse gastrique	Dulcolax 10 mg suppositoire ou autres laxatifs : Duphalac Dry sachet ou Klistier	Pas de données
EDURANT 25 mg	1.052.713	comprimé pelliculé	Rilpivirine chlorhydrate	Non	Oui Avec masque et gants		OUI			Avec un repas La biodisponibilité de la rilpivirine peut diminuer jusqu'à 50% si les cpr sont écrasés, notamment lors d'administration par sonde. Certains auteurs préconisent de doubler la dose journalière. Un monitoring des taux plasmatiques doit être effectué et le dosage augmenté au besoin par le médecin. La rilpivirine étant très peu soluble, s'assurer qu'il ne reste pas de poudre dans le godet et que le patient a tout avalé. Administrer avec un repas ou en même temps que la nutrition entérale si administré par sonde (amélioration de l'absorption).
EFAVIRENZ/ EMTRICITABINE/ TENOFOVIR DISOPROXL MYLAN 600/200/245 mg	1 080 454	comprimé pelliculé	Efavirenz - Emtricitabine - Tenofovir	Non	Non		NON	Association Stocrin sol buvable (Suisse) ou Sustiva sol buvable (France) 30 mg/mL (1 cp 600 mg = 720 mg sol buvable) et Truvada 1 cp à dissoudre dans l'eau		
EFEXOR-EXEL 37,5 mg	1.035.420	Gélule contenant des microgranules gastrorésistantes	Venlafaxine			Oui Sans écraser les microgranules	OUI	Si administration par sonde : taille > 14-16 CH Rincer la sonde avec de l'eau		Pendant les repas
EFEXOR-EXEL 75 mg	1.014.053									
EFEXOR-EXEL 150 mg	1.028.985									
ELDEPRYL 5 mg	1.018.926	comprimé	Sélégiline chlorhydrate	Non	Oui		OUI			Après le repas
ELIQUIS 2,5 mg	1.054.607	comprimé pelliculé	Apixaban	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
ELIQUIS 5 mg	1.054.608									
ELMISOL 25 mg	1.052.843	comprimé	Lévamisol		Non		NON			Pas de données
ELMISOL 50 mg	1.052.844									
EMEND 125 mg - 80 mg - 80 mg	1.029.250	gélule	Aprépitant			Oui	OUI			Pendant ou en dehors des repas
EMTRICITABINE/TENOFOVIR MYLAN 200/245 mg	1 079 837	comprimé pelliculé	Emtricitabine + Tenofovir disoproxil	Non	Non		OUI	Le comprimé pelliculé peut être délité dans environ 100 mL d'eau, de jus d'orange ou de jus de raisin et pris immédiatement		A prendre avec de la nourriture

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
EMTRIVA 200 mg	1.029.717	gélule	Emtricitabine			Oui Sans écraser les microgranules	OUI	Manipulation alternative, à préférer : solubiliser la capsule dans un verre d'eau ou de jus d'orange	Emtriva sol buvable 10 mg/mL 1 gélule à 200 mg = 24 mL soit 240 mg sol buvable	Pendant ou en dehors des repas
ENALAPRIL EG 5 mg	1.057.640	comprimé sécable	Enalapril maléate	Oui	Oui		OUI	Placer le comprimé sur 1 surface dure, la barre de cassure vers le haut. Exercer 1 pression avec le pouce, le comprimé se cassera en 2 morceaux égaux.		Pendant ou en dehors des repas
ENALAPRIL EG 20 mg	1.057.641									
ENDOXAN 50 mg	0.000.373	comprimé enrobé	Cyclophosphamide	Non	Non		OUI	Contactez la pharmacie Ne pas faire manipuler les femmes enceintes	Endoxan IV ou Endoxan sirop préparé par la pharmacie	Le matin avant le repas
ENTEROL 250 mg	1.036.603	gélule	Saccharomyces boulardii			Oui	OUI	Vérification des CI liées au patient avant ouverture		Pas de données
ENTOCORT 3 mg	1.013.259	gélule contenant des microgranules gastrorésistants	Budésonide micronisé			Oui Sans écraser les microgranules	OUI	Le contenu de la gélule doit être mélangé avec une cuillère à café de compote de pomme		Avant les repas
ENTRESTO 24/26 mg	1.063.917	comprimé pelliculé	Sacubitril + Valsartan	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
ENTRESTO 49/51 mg	1.063.918									
ENTRESTO 97/103 mg	1.066.932									
EPCLUSA 400/100 mg	1.062.200	comprimé pelliculé	Sofosbuvir + Velpatasvir	Oui	Oui		OUI	Goût amer		Pendant ou en dehors des repas
EPIVIR 150 mg	0.000.380	comprimé	Lamivudine	Non	Oui Avec masque et gants		OUI	Préférer alternative	Epiriv sol buvable 10 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas
EPIVIR 300 mg	1.016.361									
ERIVEDGE 150 mg	1.055.531	gélule	Vismodegib			Non	NON			Avec ou sans nourriture
ERY GE 500 mg	1.064.667	comprimé	Erythromycine	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI	Préférer alternative	Erythrocline suspension buvable 250 mg/5 mL	30 min avant le repas
ESBRIET 267 mg	1.050.469	gélule	Pirfénidone			Non	NON			Avec de la nourriture
ESBRIET 801 mg	1.067.087	comprimé pelliculé		Non	Non		NON			
ESCITALOPRAM EG 10 mg	1.066.690	comprimé pelliculé	Escitalopram	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
ESIDREX / ESIDRIX 25 mg	1.018.184	comprimé sécable	Hydrochlorothiazide	Oui	Oui		OUI			Pas de données
EUTHYROX 25 µg	1.054.622	comprimé sécable	Lévothyroxine sodique	Oui	Oui		OUI	Suivre le taux de TSH	L-Thyroxine SERB 150 µg/mL solution buvable	A jeun Meilleure résorption Sonde : interrompre la nutrition entérale 30 min avant et après l'administration du médicament
EUTHYROX 100 µg	0.000.401									
EVIPLERA 25/200/245 mg	1.051.845	comprimé pelliculé	Emtricitabine + Rilpivirine chlorhydrate + Tenofovir disoproxil fumarate	Non	Non		NON			Avec de la nourriture

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
EXELON 4,5 mg	1.032.808	gélule	Rivastigmine			Oui	OUI			Au moment des repas	
EXJADE 500 mg	1.037.478	comprimé dispersible	Déférasirox	Non	Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans au moins 100 mL d'eau, de jus de pomme ou d'orange		Au jeun au moins 30 minutes avant un repas	
EXJADE 360 mg	1.064.798	comprimé pelliculé	Déférasirox	Non	Oui		OUI	Le comprimé écrasé doit être saupoudré dans une petite quantité de nourriture non solide (ex: yaourt ou compote de pomme)		Au jeun ou avec un repas léger	
EXVIERA 250 mg	1.058.604	comprimé pelliculé	Dasabuvir	Non	Non		NON			Avec de la nourriture	
EZETIMIBE EG 10 mg	1.084.894	comprimé	Ezetimibe	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas	
EZETROL 10 mg	1.034.169	comprimé	Ezetimibe	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas	
FAMPYRA 10 mg	1.049.528	comprimé pelliculé à libération prolongé	Fampridine	Non	Non		NON			Pas de données	
FERO-GRADUMET 525 mg	0.000.430	comprimé enrobé	Fer sulfate		Non		NON	Perte de l'effet retard et irritation des muqueuses	Loserron comprimé effervescent ou Ferro Sanol sol buvable 30 mg/mL ou Venofer IV Dose à adapter	30 minutes avant le petit déjeuner	
FIRDAPSE 10 mg	1 062 070	comprimé	Amifampridine	Oui	Non		NON			Pendant le repas	
FLAGYL 500 mg	0.000.439	comprimé pelliculé	Métronidazole	Non	Oui Avec masque et		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pendant les repas meilleure tolérance digestive	
FLOXYFRAL 100 mg	1.018.388	comprimé pelliculé sécable	Fluvoxamine		Oui		OUI			Le matin	
FLUANXOL 1 mg	1.019.610	comprimé	Flupentixol	Oui (uniquement pour	Oui		OUI	Barre de cassure ne divise pas en deux le comprimé		Pendant le repas	
FLUDEX LP 1,5 mg	1.019.412	comprimé pelliculé à libération prolongé	Indapamide	Non	Non		NON		Fludex 2,5 mg	De préférence le matin	
FLUDEX 2,5 mg	1.019.360	comprimé pelliculé	Indapamide hémihydraté	Non	Oui		OUI			De préférence le matin	
FLUOXETINE EG 20 mg	1.055.004	gélule	Fluoxetine			Oui	OUI			Pendant ou en dehors des repas	
FOLAVIT 4 mg	1.019.860	comprimé	Acide folique	Oui (uniquement pour	Oui		OUI	Barre de cassure ne divise pas en deux le comprimé		Pendant les repas	
FORTECORTIN 4 mg 	0.000.463	comprimé quadrisécable	Dexaméthasone	Oui	Oui		OUI	Dissolution spontanée dans l'eau. Goût amer. Administration immédiate après dissolution car principe actif sensible à la lumière		Pendant ou après les repas	
FORXIGA 10 mg	1 054 999	comprimé pelliculé	Dapagliflozine	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas	

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
FRISIUM 10 mg	0.000.473	comprimé sécable	Clobazam	Oui	Oui		OUI			Pas de données	
FURADANTINE MC 50 mg	0.000.480	gélule	Nitrofurantoïne macrocristaux			Oui Avec masque et	OUI	Dissoudre le contenu de la gélule dans un peu d'eau. Ne pas écraser les		Pendant les repas	
GABBRORAL 250 mg	0.000.481	comprimé	Paromomycine	Non	Oui Avec masque et gants		OUI			Pas de données	
GALAFOLD 123 mg	1 080 508	gélule	Migalastat			Non	NON			Ne pas mangé 2h avant ou 2h après la prise du traitement (= 4h de jeûne)	
GARDENAL 100 mg	0.000.488	comprimé	Phénobarbital	Non	Oui		OUI		Préparation pour la Pédiatrie d'un sirop Phénobarbital 10 mg/mL	Pas de données	
GENVOYA 150/150/200/10 mg	1.060.662	comprimé pelliculé	Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir alafenamide fumarate	Non	Oui		OUI			Avec nourriture	
GILENYA 0,5 mg	1.049.995	gélule	Fingolimod			Non	NON			Au cours ou en dehors des repas	
GIOTRIF 30 mg	1.056.311	comprimé pelliculé	Afatinib	Non	Non		OUI	Le comprimé peut être dissout dans 100 ml d'eau plate (sans être écrasé) A prendre maximum dans les 15 minutes suivant dispersion. Rincer avec 100 ml d'eau		A jeun Pas de nourriture 3 h avant et 1 h après la prise du comprimé	
GIOTRIF 40 mg	1.055.419										
GLIMEPIRIDE EG 2 mg	1.079.092	comprimé sécable	Glimépiride	Oui	Oui		OUI			Immédiatement avant ou pendant le petit déjeuner ou le repas principal	
GLUCOBAY 100 mg	1.018.904	comprimé sécable	Acarbose	Oui	Oui		OUI			A prendre immédiatement avant les repas ou bien peuvent être mâchés et avalés avec la première bouchée du repas	
GLUCOPHAGE 500 mg	0.000.513	comprimé pelliculé	Metformine	Non	Oui		OUI	Goût amer		Pendant ou après les repas	
GLUCOPHAGE 850 mg	0.000.514										
GLURENORM 30 mg	1.019.307	comprimé	Gliquidone	Oui	Oui		OUI			Avant le petit déjeuner ou au moment des repas	
HALCION 0,25 mg	1.015.148	comprimé sécable	Triazolam	Oui	Oui		OUI			Pas de données	
HALDOL 2 mg	1.013.024	comprimé quadrisécable	Halopéridol	Oui (en 4)	Non		NON		Haldol goutte buvable 2 mg = 1 mL = 20 gouttes	Pas de données	
HALDOL 5 mg	1.018.198	comprimé quadrisécable	Halopéridol	Oui (en 4)	Non		NON		Haldol goutte buvable 2 mg = 1 mL = 20 gouttes	Pas de données	
HARVONI 90/400 mg	1.057.821	comprimé pelliculé	Ledispavir + Sofosbuvir	Non	Oui		OUI	Goût amer		Pendant ou en dehors des repas	
HYDREA 500 mg	0.000.596	gélule	Hydroxycarbamide			Oui Avec masque et gants	OUI	Dispersion possible de la gélule dans un verre d'eau Il est normal que certains excipients		Pas de données	



Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
HYDROCORTISONE Jenafarm 10 mg	1 074 437	comprimé sécable	Hydrocortisone	Oui	Oui		OUI	A mélanger à l'alimentation		Matin, midi et 16 h
IBRANCE 75 mg	1 080 025	comprimé pelliculé	Palbociclib			Non	NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse		Pendant ou en dehors des repas
IBRANCE 100 mg	1 080 026									
IBRANCE 125 mg	1 080 027									
IBU-RATIOPHARM 200 mg	0.006.002	comprimé	Ibuprofène	Non	Oui		OUI			1 heure avant les repas
IBUPROFENE EG 400 mg	1.055.026			Non						
IBUPROFENE EG 600 mg	1.051.745			Oui						
ICLUSIG 15 mg	1 060 981	comprimé pelliculé	Ponatinib		Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
ICLUSIG 30 mg	1 078 020									
ICLUSIG 45 mg	1.059.418									
IMBRUVICA 140 mg	1 075 466	comprimé pelliculé	Ibrutinib		Non		NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse ou des oranges de Séville		Pas de données
IMBRUVICA 280 mg	1 075 465									
IMBRUVICA 420 mg	1 075 464									
IMNOVID 2 mg	1.056.526	gélule	Pomalidomide			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas
IMNOVID 3 mg	1.055.868									
IMNOVID 4 mg	1.056.083									
IMODIUM INSTANT 2 mg	1.019.097	comprimé dispersible	Loperamide		Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans de l'eau		Pas de données
IMOVANE 7,5 mg	0.000.612	comprimé pelliculé sécable	Zopiclone	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à l'humidité de l'air		Juste avant le coucher
IMURAN 50 mg	0.000.616	comprimé pelliculé	Azathioprine			Non	OUI	Dispersible dans l'eau, utiliser des gants et masque et une seringue orale		1 h avant ou 3 heure après l'ingestion de nourriture ou de lait
INCIVO 375 mg	1.049.213	comprimé pelliculé	Telaprevir	Non	Non		NON			Avec de la nourriture
INDERAL 10 mg	0.000.619	comprimé sécable	Propranolol	Oui	Oui		OUI			Avant les repas
INDERAL 40 mg	0.000.620	comprimé sécable								
INDOMET Ratio 25 mg	1.045.079	gélule	Indométacine			Oui	OUI			Pendant les repas
INGREZZA 40 mg	1.068.711	gélule	Valbenazine			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas
INGREZZA 80 mg	1.069.593									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
INLYTA 1 mg	1.054.640	comprimé pelliculé	Axitinib	Non	Non		NON	Préparation d'une suspension orale en faisant dissoudre le comprimé dans 20 mL d'eau (Ne PAS utiliser de l'eau du robinet)		Pendant ou en dehors des repas	
INLYTA 5 mg	1.052.785										
INOVELON 200 mg	1.052.898	comprimé	Rufinamide		Oui		OUI		Inovelon suspension buvable 40 mg/mL	A prendre matin et soir au cours du repas	
INOVELON 400 mg	1.052.899										
INSPRA 25 mg	1.044.374	comprimé pelliculé	Eplérénone	Non	Non		NON			Avec ou sans nourriture	
INTELENCE 200 mg	1.052.786	comprimé	Etravirine		Non		OUI	Disperser le comprimé dans un verre d'eau		Après un repas	
INVEGA 3MG	1.043.089	comprimé à libération prolongée	Palipéridone		Non		NON		Risperdal comprimé à libération immédiate Paliperidone : métabolite actif de la risperidone (Avis spécialisé)	A prendre toujours dans les mêmes conditions	
INVEGA 6MG	1.043.268										
INVEGA 9MG	1.042.811										
INVIRASE 500 mg	1.034.477	comprimé pelliculé	Saquinavir mésilate		Non		NON			Dans les 2 heures suivant un repas	
IODURE DE POTASSIUM 65 mg	1.046.757	comprimé	Iodure de potassium		Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans un peu d'eau puis verser le mélange dans une		Pas données	
IRESSA 250 mg	1.045.254	comprimé pelliculé	Géfitinib	Non	Non		OUI	Disperser le comprimé dans un demi verre d'eau non pétillante (sans écraser le comprimé) La dissolution du comprimé peut prendre jusqu'à 20 min en le remuant		Au cours ou en dehors des repas	
ISENTRESS 400 mg	1.040.356	comprimé pelliculé	Raltégravir	Non	Oui		OUI	Biodisponibilité augmenté de 30% quand broyé mais ne pas changer la dose		Au cours ou en dehors des repas	
ISENTRESS 600 mg	1.068.951			Oui	Non		NON	comprimé à 400 mg Posologie à revoir avec la médecin			
ISOKET RETARD 20 mg	0.000.658	comprimé à libération prolongée	Dinitrate d'isosorbide	Non	Non		NON		Voie transdermique : Minitran TTS 5 mg ou 10 mg	Pendant ou en dehors des repas	
ISOKET RETARD 120 mg	1.007.462	gélule à libération prolongée		Oui Sans écraser les microgranules	OUI						
ISOPTINE MITE 40 mg	0.000.669	comprimé pelliculé	Vérapamil		Oui		OUI			Pendant ou après les repas	
ISOPTINE RR 240 mg	0.000.670	comprimé sécable à libération prolongée		Oui	Non		NON	Isoptine Mite 40 mg : posologie à adapter			
JAKAVI 5 mg	1.052.919	comprimé	Ruxolitinib phosphate	Non	Non		NON			Au cours ou en dehors des repas	
JAKAVI 15 mg	1.052.970										




Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
JAKAVI 20 mg	1.052.972										
JANUVIA 100 mg	1.039.322	comprimé pelliculé	Sitagliptine	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas	
JARDIANCE 10 mg	1.064.325	comprimé pelliculé	Empagliflozine	Oui	Oui					Au cours ou en dehors des repas	
JARDIANCE 25 mg	1.063.092										
JINARC 45/15 mg	1 077 902	comprimé	Tolvaptan	Non	Non		NON			La première dose (matin) doit être prise 30min avant le petit déjeuner, la seconde dose (soir) doit être prise avec ou sans nourriture	
JINARC 60/30 mg	1 079 549										
JINARC 90/30 mg	1 080 417										
JULUCA 50/25 mg	1.069.414	comprimé pelliculé	Dolutegravir - Rilpivirine	Oui	Oui		OUI	La biodisponibilité de la rilpivirine peut diminuer jusqu'à 50% si les cop sont		Pendant les repas	
KAFTRIO 37,5/25/50 mg	1 080 524	comprimé pelliculé	Ivacaftor - Tezacaftor - Elexacaftor	Non	Non		NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse		Au cours d'un repas riche en graisse	
KAFTRIO 75/50/100 mg	1 076 215										
KALETRA 200/50 mg	1.034.650	comprimé pelliculé	Lopinavir - Ritonavir	Non	Non		NON		Kaletra sol buvable 80/20 mg/mL (contient de l'alcool 42%V/V) Si administration par sonde : Ne pas diluer la solution buvable avant administration et rincer la sonde avec du LAIT entier	Pendant les repas	
KALETRA 100/25 mg	1.058.419										
KALYDECO 75 mg	1 080 559	comprimé pelliculé	Ivacaftor	Non	Non		NON	Ne pas administrer avec du jus de pamplemousse ou de l'orange amère		Au cours d'un repas riche en graisse	
KALYDECO 150mg	1 075 842										
KALINOR	0.00.682	comprimé effervescent	Citrate de potassium hydrogencarbonate de potassium - acide citrique				OUI	Dissoudre le comprimé dans un peu d'eau et attendre jusqu'à ce que tout le gaz carbonique soit parti pour éviter		Pendant le repas	

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
KALINOR Retard P 600 mg	1.018.944	gélule à libération retardée	Potassium chlorure			Oui Sans écraser les microgranules	OUI			Pendant le repas avec beaucoup d'eau
KAYEXALATE CALCIUM	0.000.693	poudre pour solution buvable ou rectale	Polystyrène sulfonate de calcium				OUI	1 mesurette = 15 g a dissoudre dans 100ml d'eau En cas de difficulté de déglutition, le produit peut être administré à l'aide d'une canule de Ryle ou d'une sonde en polythène de 2 à 3 mm de		Pas données
KAYEXALATE SODIUM	0.000.694		Polystyrène sulfonate de sodium							
KEFORAL 500 mg	1 041 061	comprimé pelliculé sécable	Cefalexine	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière	Keforal sirop 250 mg/5 mL	A jeun
KEMADRIN 5 mg	0.000.697	comprimé sécable	Procyclidine chlorhydrate	Oui	Oui		OUI			Après le repas
KEPPRA 250 mg	1.036.516	comprimé pelliculé	Lévétiracetam	Oui	Oui		OUI	Goût amer Préférer l'alternative	Kepra sol buvable 100 mg/mL (contient du mannitol)	Pendant ou en dehors des repas
KEPPRA 500 mg	1.020.027									
KEPPRA 1000 mg	1.020.009									
KETOCONAZOLE HRA 200 mg	1 060 275	comprimé	kétoconazole							Pas de données
KISQALI 200 mg	1.068.662	comprimé pelliculé	Ribociclib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
KIVEXA 600/300 mg	1.032.091	comprimé pelliculé	Abacavir sulfate - Lamivudine		Non		NON		2 molécules séparément : Ziagen sol buvable 20 mg/mL + Eпивir sol	Pendant ou en dehors des repas
KREDEX 6,25 mg	1.012.960	comprimé sécable	Carvédilol	Oui	Oui		OUI			Pendant les repas
KREDEX 25 mg	1.012.959									
KUVAN 100 mg	1.045.656	comprimé pour solution buvable	Saproptérine		Oui		OUI	Dissoudre le comprimé dans un verre d'eau (120 - 240 mL)		Au cours d'un repas
LAGEVRIO 200 mg	1 080 024	gélule	Molnupiravir			Non	NON	A prendre avec beaucoup de liquide		Pendant ou en dehors des repas
LAMICTAL 5 mg dispersible	1.044.445	comprimé dispersible								

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
LAMICTAL 25 mg dispersible	1.011.992	ou à croquer ou à avaler	Lamotrigine		Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans de l'eau ou le croquer		A prendre en dehors des repas pour une action plus rapide. La nourriture ne modifie pas la quantité absorbée
LAMICTAL 50 mg dispersible	1.019.404									
LAMICTAL 100 mg dispersible	1.011.993									
LAMPRENE 50 mg	1.057.628	capsule molle	clofazimine			Non	NON			Pendant les repas ou avec un verre de lait
LANOXIN 0,125 mg	0.000.709	comprimé	Digoxine		Oui		OUI	Préférer alternative	Lanoxin sol buvable 0,05 mg/mL	Pas de données
LANOXIN 0,25 mg	0.000.707									
LARIAM 250 mg	0.000.717	comprimé	Méfloquine chlorhydrate	Oui	Oui		OUI	Très amer et piquant		Après le repas principal
LASIX 40 mg	0.000.719	comprimé sécable	Furosémide	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à l'humidité		De préférence le matin
LASIX 500 mg	0.000.721	comprimé quadrisécable								
LEDERTREXATE 2,5 mg	1.018.940	comprimé	Methotrexate		Non		NON		Autre voie d'administration IV-SC	Pas de données
LENVIMA 4 mg	1 066 231	gélule	Lenvatinib			Oui	OUI	A mélanger (écrasées ou non) à une cuillère à soupe d'eau/ jus de pomme dans un verre (=suspension) Laisser les gélules dans le liquide pendant au moins 10 minutes, puis remuer pendant au moins 3 minutes		Pendant ou en dehors des repas
LENVIMA 10 mg	1 066 230									
LETROZOLE TEVA 2,5 mg	1.084.445	comprimé pelliculé	Letrozole	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
LEPONEX 25 mg	0.000.740	comprimé sécable	Clozapine	Oui	Oui		OUI	Ne pas dissoudre dans l'eau car présence d'excipients insoluble Administration avec un peu de nourriture		Pendant ou en dehors des repas
LEPONEX 100 mg	1.019.246									
LERIVON 10 mg	0.000.742	comprimé pelliculé	Miansérine	Non	Non		NON			Pas de données
LEVOCETIRIZINE EG 5 mg	1.055.005	comprimé pelliculé	Levocetirizine	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
LEXOTAN 3 mg	0.000.747	comprimé sécable	Bromazépan	Oui	Oui		OUI			Pas de données
LEXOTAN 6 mg	0.000.748									
LIORESAL 10 mg	0.000.749	comprimé sécable	Baclofène	Oui	Oui		OUI			Pendant les repas
LIORESAL 25 mg	0.000.750									
LIPANTHYL NANO 145 mg	1.041.042	comprimé pelliculé	Fénofibrate	Non	Non		NON	Nanoparticules à libération prolongée	Lipanthyl 200 mg Ouvrir la gélule sans écraser les microgranules	Pendant ou en dehors des repas
LIPANTHYL 267 mg	1.018.856	gélule	Fénofibrate			Oui	OUI	Principe acif pas bien soluble dans l'eau, le mélanger plutôt à une compote Risque de boucher la sonde, administrer et rincer avec beaucoup d'eau		Pendant les repas
LIPITTOR 10 mg	1.006.258									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
LIPITOR 20 mg	1.006.257	comprimé pelliculé	Atorvastatine	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
LIPITOR 80 mg	1.038.785									
LITICAN 50 mg	1.019.241	comprimé	Alizapride		Oui		OUI			Avant les repas
LISINOPRIL TEVA 5 mg	1.084.447	comprimé sécable	Lisinopril dihydrate	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
LISINOPRIL TEVA 20 mg	1.084.446									
LIXIANA 30 mg	 1.061.746	comprimé pelliculé	Edoxaban	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
LIXIANA 60 mg	 1.063.872									
LONSURF 15 mg	1.063.590	comprimé pelliculé	Trifluridine tipiracil	Non	Non		NON			1 h après le repas
LONSURF 20 mg	1.063.591									
LORAMET 2 mg	1.041.416	comprimé sécable	Lormétazépan	Oui	Oui		OUI			Avant le coucher
LORVIQUA 100 mg	1 075 198	comprimé pelliculé	Lorlatinib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
LOSARTAN EG 50 mg	1.054.979	comprimé pelliculé quadrisécable	Losartan	Oui (en 4)	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
LOSFERRON 695 mg	0.000.770	comprimé effervescent	Fer gluconate				OUI	Dissoudre le comprimé dans un peu d'eau et attendre jusqu'à ce que tout le gaz carbonique soit parti pour éviter risque de reflux oesophagien		30 min avant le repas
LOXEN 20 mg	1.043.430	comprimé sécable	Nicardipine	Oui	Oui		OUI	Principe actif sensible à la lumière		30 min avant le repas
LOXEN LP 50 mg	1.050.056	gélule à libération prolongée				Non	NON			Avant les repas
LYNPARZA 50 mg	1.058.556	gélule	Olaparib			Non	NON			1 heure avant ou 2 heures après manger
LYRICA 25 mg	1.045.259	gélule	Prégabaline							Pendant ou en dehors des repas
LYRICA 75MG	1.030.285									
LYRICA 150MG	1.030.284									
LYRICA 300 mg	1.030.283									
LYSANXIA 10 mg	0.000.777	comprimé sécable	Prazépan	Oui	Oui		OUI		Lysanxia solution buvable 15 mg/mL 1 cp à 10 mg = 10 gouttes	Pas données
LYSDREN 500 mg	1.046.012	comprimé	Mitotane	Oui	Non		NON	A manipuler avec des gants Ne pas faire manipuler les femmes		Au cours d'un repas riche en graisse
LYSOMUCIL 200 mg	1.051.682	Sachet	Acétylcystéine				OUI	Dissoudre le sachet dans un verre		De préférence au moment des repas



















Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
LYSOMUCIL 600 mg	1.051.683	sachet	Acétylcystéine				OUI	d'eau		De préférence au moment des repas
MAGNE B6	0.000.783	comprimé enrobé	Magnésium lactate		Non		NON		Donner Magnésium (Ultra-Mg 3 g sachet) et vitamine B6 (pyridoxine)	Pendant les repas
MALARONE 250/100 mg	1.017.090	comprimé pelliculé	Atovaquone		Oui		OUI	Mélanger la poudre avec une boisson lactée ou de la nourriture		Pendant un repas et de préférence toujours à la même heure
MAVENCLAD 10 mg	1.066.338	comprimé	Cladribine	Non	Non		NON			Au cours ou en dehors de repas
MAVIRET 100/40 mg	1.065.292	comprimé pelliculé	Glecaprevir - Pibrentasvir	Non	Non		NON			Avec de la nourriture
MAXALT LYO 10 mg	1.032.056	comprimé Lyotaps = comprimé orodispersible	Rizatriptan		Non		OUI	Le comprimé fond directement dans la bouche ou le dissout dans un peu d'eau		Absorption retardée en présence d'un repas
MAYZENT 0,25 mg	1.077.900 1.080.029	comprimé pelliculé	Siponimod	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
MAYZENT 2 mg	1 077 888									
MEDIKINET RETARD 10 mg	1.046.345	gélule à libération prolongée				Oui	OUI	Ne pas écraser les microgranules. Elles peuvent être dispersées dans un aliment mou et froid (yaourt ou compote) qui doit être ingéré immédiatement		Au cours ou en dehors du repas
MEDIKINET RETARD 20 mg	1.046.695									
MEDROL 4 mg	0.000.804	comprimé sécable	Methylprednisolone	Oui	Oui		OUI			De préférence le matin au cours du repas
MEDROL A 16 mg	0.000.806									
MEKINIST 0,5 mg	1.055.697	comprimé	Trametinib		Non		NON			Au moins 1 h avant les repas ou 2 h après un repas
MEKINIST 2 mg	1.055.691									
MELPERON Ratiopharm 25 mg	1.054.739	comprimé pelliculé	Melperon	Oui	Non		NON		Melperon sol buvable 25 mg/5 mL	Pendant ou en dehors des repas
MEPHENON 5 mg	1 034 429	comprimé	Methadone	Oui (uniquement pour faciliter la prise =	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pas de données
MESALAZINE TEVA 500 mg	1 061 897	comprimé gastro-résistant	Mesalazine		Non		NON		Pentasa 2 g sachet ou forme rectale sur Ordonnance	Avant les repas
MESTINON 10 mg	0.000.813	comprimé	Pyridostigmine bromure	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif très sensible à l'humidité		1 heure avant les repas





Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
MESTINON 60 mg	1.011.779	comprimé enrobé								
METHASAN 40 mg										
METOPROLOL EG Retard 100 mg	1.049.443	comprimé pelliculé sécable à libération prolongée	Metoprolol	Oui	Non		NON		Seloken 100 mg comprimé à libération immédiate	Pendant les repas
MEXILETINE 200 mg	1 062 728	gélule	Mexilétine			Oui (écrasable)	OUI	A prendre avec un grand verre d'eau. Ne pas s'allonger directement après avoir pris les gélules		En cas d'intolérance digestive, prendre au cours d'un repas
MICARDIS 40 mg	1.019.748	comprimé	Telmisartan	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
MICARDIS 80 mg	1.019.824									
MIFEGYNE 200 mg	1.015.415	comprimé	Mifépristone		Oui		OUI			Pas de données
MINIRIN MELT 60 µg	1.064.091	Lyophilisat	Desmopressine acétate	Non	Non		NON			L'apport de nourriture peut réduire l'intensité et la durée de l'effet
MIMPARA 30 mg	1.038.446	comprimé pelliculé	Cinacalcet chlorhydrate	Non	Oui		OUI			Au cours ou après un repas
MIRAPEXIN 0,7 mg	1.019.978	comprimé sécable	Pramipexole	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
MIRAPEXIN LP 0,26 mg	1.048.537	comprimé à libération prolongée		Non	Non		NON		Mirapexin comprimé à libération immédiate en répartissant la dose journalière en 3 prises par jour	
MIRAPEXIN LP 1,05 mg	1.049.616									
MNESIS 45 mg	1.017.971	comprimé pelliculé	Idébénone	Non	Non		NON			Après les repas
MOVICOL Neutral	1.016.811	Sachet	Macrogol - Bcarbonate de sodium - NaCl - KCl				OUI	Dissoudre un sachet dans 125 mL d'eau		Pas de données
MOVICOL Junior Neutral	1.040.168	Sachet	Macrogol - Bcarbonate de sodium - NaCl - KCl				OUI	Dissoudre un sachet dans 62,5 mL d'eau		Pas de données
MOXIFLOXACINE EG 400 mg	1.066.378	comprimé pelliculé	Moxifloxacine		Oui		OUI	Mauvais goût si administration orale dissoudre la poudre avec un peu d'eau		Pendant ou en dehors des repas
MOXONIDINE EG 0,2 mg	1.064.357	comprimé pelliculé	Moxonidine	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement		Pendant ou en dehors des repas
MS CONTIN 10 mg 	0.000.856	comprimé à libération prolongée	Morphine sulfate	Non	Non		NON		MS Direct ou Oramorph en plusieurs administration par jour	Pas de données
MS CONTIN 30 mg 	0.000.858									
MS DIRECT 10MG 	1.012.350	comprimé sécable (libération directe)		Oui	Oui		OUI		Oramorph 10 mg/5 mL (sulfate de morphine)	

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
MYAMBUTOL 400 mg	0.000874	comprimé pelliculé sécable	Ethambutol chlorhydrate	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI	A utiliser rapidement car peu stable en suspension		Pendant ou en dehors des repas	
MYCOBUTIN 150 mg	1.014.161	gélule	Rifabutine			Oui Avec masque et	OUI	Dissoudre le contenu de la gélule dans un peu d'eau.		Pendant ou en dehors des repas	
MYSOLINE 250 mg	1.022.370	comprimé sécable	Primidone	Oui	Oui		OUI	Attention aux imprécisions de dosage au moment de l'écrasement : risque de sous ou surdosage cliniquement significatif			
NACL ERJEAN 500 mg	1.047.310	comprimé	Chlorure de sodium		Oui		OUI			Pas de données	
NATULAN 50 mg	1.015.589	gélule	Procarbazine			Oui Avec masque et gants	OUI	Très amer Peut être mélanger avec du sirop pour masquer l'amertume Ne pas faire manipuler les femmes enceintes		Pas de données	
NAVELBINE 20 mg	1.027.302	capsule molle	Vinorelbine				Non	Ne pas piquer la capule	Navelbine injectable	En fin de repas	
NAVELBINE 30 mg	1.027.303										
NEO-CODION	1.000.050	comprimé pelliculé	Codéine camsilate		Oui		OUI			Pas de données	
NEORAL SANDIMMUN 25 mg	1.056.332	gélule	Ciclosporine			Non	NON		Neoral Sandimmun sol buv 100 mg/mL A diluer avec du jus d'orange, du lait ou du cola dans un récipient en verre NE PAS MELANGER AVEC DE L'EAU	Pas de données	
NEORAL SANDIMMUN 100 mg	1.056.333										
NEUROBION N Forte	0.000.934	comprimé enrobé	Cyanocobalamine - Pyridoxine chlorhydrate -		Oui		OUI	A utiliser immédiatement car certaines vitamines sont sensibles à la lumière		Pendant ou en dehors des repas	
NEURONTIN 100 mg	1.019.939	gélule	Gabapentine					Ne pas mélanger ni administrer avec du Mg2+ ni avec Al3+		Pendant ou en dehors des repas.	
NEURONTIN 300 mg	1.019.531										
NEURONTIN 400 mg	0.003.282										
NEURONTIN 600 mg	1.020.014	comprimé pelliculé	Gabapentine	Oui	Oui		OUI	Idem gélule		Idem gélule	
NEXAVAR 200 mg	1.036.219	comprimé pelliculé	Sorafenib	Oui	Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans de l'eau sans l'écraser		En dehors des repas ou avec un repas pauvre en graisse	

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
NEXIAM 20MG	1.015.756	comprimé gastro-résistant	Esomeprazole	Non	Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans de l'eau sans l' écraser : mettre le comprimé dans une seringue, aspirer de l'eau fermer la seringue avec un bouchon, mélanger jusqu'à obtention d'une suspension		Pendant ou en dehors des repas
NEXIAM 40MG	1.015.757									
NICOTIBINE 300 mg	0.000.936	comprimé sécable	Isoniazide	Oui Avec masque et gants	Oui Avec masque et gants		OUI			Pas de données
NIFEDIPIN AL 10 mg	1.070.510	capsule molle	Nifédipine				NON	Ne pas percer ou piquer la capsule	Nifedipin sol buvable 20 mg/mL Posologie à adapter Ou autre inhibiteur calcique	Indépendamment des repas
NIFEDIPINE MYLAN LP 30 mg	1.052.594	comprimé pelliculé à libération prolongée		Non	Non					
NIMOTOP 30 mg	0.000.939	comprimé	Nimodipine	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pendant ou en dehors des repas
NINLARO 2,3 mg	1.065.595	gélule	Ixazomib			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas
NINLARO 3 mg	1.063.698									
NINLARO 4 mg	1,064,326									
NIQUITIN MINT 2 mg	1.039.218	comprimé à sucer	Nicotine		Non		NON		Nicotinell patch	Ne pas boire ni manger avec le comprimé dans la bouche
NOBITEN 5 mg	1.019.873	comprimé quadrisécable	Néбиволol	Oui (en 4)			OUI			Au même moment de la journée
NORIT CARBOMIX 50 g	0.000.187	Granulés pour suspension buvable ou pour utilisation par sonde gastrique	Charbon absorbant				OUI	Ajouter de l'eau potable dans le flacon jusqu'au repère de l'étiquette (environ 250 mL), bien agiter Faire boire la suspension au patient ou l'administrer par la sonde gastrique grâce à l'adaptateur universel fourni La suspension préparée doit être utilisée aussitôt, jamais au-delà de quelques heures		Pas de données



Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
NORVIR 100 mg	0.000.958	comprimé pelliculé	Ritonvir		Non		NON	Goût amer peut être masqué en le mélangeant à du lait chocolaté	Norvir solution buvable 80 mg/mL (contient de l'alcool 43,2% v/v) Sirop à administrer sans dilution: Rincer la sonde avec du lait entier. Ne pas utiliser d'eau.	De préférence au cours d'un repas
NOVONORM 1 mg	1.019.580	comprimé	Répaglinide		Oui		OUI	Principe actif non soluble dans l'eau		Entre 15 min avant ou 30 min après un repas
NOVOTHYRAL 100 mcg	1 019 391	comprimé	Lévothyroxine sodique - liothyronine sodique		Oui		OUI			Le matin 30 min avant le petit déjeuner
NOVOTHYRAL 75 mcg	1.019.670									
NOXAFIL 100 mg	1.058.930	comprimé gastrorésistant	Posaconazole	Non	Non		NON		Noxafil suspension buvable 40 mg/mL Attention posologie différente entre les 2 formes galéniques	Pendant ou en dehors des repas
NOZINAN 25 mg	0.000.968	comprimé pelliculé sécable	Lévomépromazine		Oui	Oui	OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière	NOZINAN gouttes 40 mg/mL (contient de l'éthanol!) (1 goutte = 1 mg)	Pendant les repas
NOZINAN 100 mg	0.000.967									
NUPLAZID 17 mg	1.064.129	gélule	Pimavanserin			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas
OCALIVA 5 mg	1.070.807	comprimé pelliculé	Acide obeticholique	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas Délai de 4-6 h avec la prise de résine
ODEFSEY 200/25/25 mg	1.062.591	comprimé pelliculé	Emtricitabine + Rilpivirine chlorhydrate + Tenofovir	Non	Non		NON			Avec de la nourriture
OFEV 150 mg	1.058.570	capsule molle	Nintedanib				NON	Ne pas percer la capsule		Avec de la nourriture
OFEV 100 mg	1.060.456									
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		comprimé orodispersible	Olanzapine	Non	Non		OUI	Dilution possible dans un grand verre d'eau ou jus de pomme, jus d'orange)		Pendant ou en dehors des repas
OLANZAPINE INSTANT EG 10 mg										
OLYSIO 150 mg	1.056.287	gélule	Siméprevir			Non	NON			Avec de la nourriture
OMIC OCAS 0,4 mg	1.015.187	comprimé à libération prolongée	Tamsulosine chlorhydrate	Non	Non		NON	Perte de l'effet retard	Tamsulosine Ratio 0,4 mg gélule qui peut être ouverte. Ne pas écraser les	Pendant ou en dehors des repas
ONDANSETRON EG 8 mg	1.044.444	comprimé pelliculé	Ondansétron	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à	Zophren sirop 4 mg/5 mL ou Ondansetron Ratio 4 ou 8 mg	Indépendamment des repas Chimio : 8 mg 1 à 2 h avant cure
OPSUMIT 10 mg	1.056.639	comprimé pelliculé	Macicentan	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
ORKAMBI 100/125 MG	1.070.066									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
ORKAMBI 200/125 mg	1.061.933	comprimé pellicule	Lumacaftor - Ivacaftor	Non	Non		NON			Avec de la nourriture riche en graisse
OXAZEPAM EG 15 mg	0.001.215	comprimé	Oxazepam	Oui	Oui		OUI			Pas de données
OXYCONTIN 5 mg  	1.046.755	comprimé pelliculé à libération prolongé	Oxycodone chlorhydrate	Non	Non		NON	Perte de l'effet retard	Oxynorm instant en répartissant les prises sur 24 h ou Oxynorm par voie injectable	Pendant ou en dehors des repas
OXYCONTIN 10 mg  	1.032.173									
OXYCONTIN 20 mg  	1.048.722									
OXYCONTIN 40 mg  	1.046.980									
OXYNORM INSTANT 5 mg 	1.046.346	comprimé orodispersible	Oxycodone chlorhydrate	Non	Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans un peu d'eau ou laisser fondre le comprimé dans la bouche		Pendant ou en dehors des repas
OXYNORM INSTANT 10 mg 	1.044.939									
OXYNORM INSTANT 20 mg 	1.064.435									
PALEXIA 50 mg 	1.069.427	comprimé pelliculé	Tapentadol	Non	Oui		Oui			Pendant ou en dehors des repas
PALEXIA RET 50 mg 	1.069.130	comprimé à libération prolongée		Non	Non		NON			
PALEXIA RET 100 mg 	1.068.954									
PALLADONE Immed Release  mg	1.031.585	gélule à libération immédiate				Oui			PALLADONE Immed Release 2,6 mg en répartissant les prises sur 24 h ou Palladone par voie injectable	
PALLADONE Slow Release 4 mg 	1.029.611	gélule à libération prolongée				Oui				
PALLADONE Slow Release 8 mg 	1.029.612					Sans écraser les microbilles				
PALLADONE Slow Release 16 mg 	1.030.497									
PANTOMED 20 mg	1.053.134	comprimé gastrorésistant	Pantoprazole	Non	Non		NON	Perte de l'effet du pantoprazole si on coupe ou broye le comprimé --> ne se dissout pas dans l'eau --> faut préférer l'alternative si nécessaire	Nexiam 20 ou 40 mg à dissoudre dans l'eau	Avant un repas
PANTOMED 40 mg	1.052.497									
PARACETAMOL EG 500 mg	1.057.444	comprimé sécable	Paracétamol	Oui	Oui		OUI			Pas de données
PARACETAMOL EG 1000 mg	1.059.924	comprimé sécable	Paracétamol	Oui	Oui		OUI			Pas de données

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
PAROXETINE EG 20 mg	1.049.502	comprimé pelliculé	Paroxétine	Oui	Oui		OUI			Le matin au cours du petit déjeuner
PAXLOVID 150/100 mg	1 080 646	comprimé pelliculé	PF-07321332 - Ritonavir	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
PENTOXIFYLLIN RET 400 mg	0.001.044	comprimé pelliculé à libération prolongée	Pentoxifylline	Non	Non		NON	Perte de l'effet retard		Pendant les repas
PIFELTRO 100 mg	1 080 084	Comprimé pelliculé	Doravirine	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
PIQRAY 150 mg	1 077 761	Comprimé pelliculé	Alpérisib	Non	Non		NON			Pas de données
PIQRAY 200 mg	1 077 762	Comprimé pelliculé								
PIQRAY 200 + 50 mg	1 077 762	Comprimé pelliculé								
PIRACETAM EG 800 mg	1.057.445	comprimé	Piracetam	Oui	Oui		OUI			Pendant ou immédiatement après un repas
PIRACETAM EG 1200 mg	1.057.446									
PIROXICAM EG 20 mg	1 079 099	comprimé dispersible	Piroxicam	Non	Non		OUI	Les comprimés peuvent être dispersés dans un minimum de 50 ml d'eau		Pendant les repas
PK MERZ 100 mg	0.001.067	comprimé pelliculé sécable	Amantadine	Oui	Oui		OUI			Pas de données
PLAVIX 75 mg 	1.008.892	comprimé pelliculé	Clopidogrel hydrogénosulfate		Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière et à l'humidité		Pendant ou en dehors des repas
PLAVIX 300 mg 	1.041.298									
POSACONAZOLE ACCORD 100 mg		comprimé gastro	Posaconazole	Non	Non		NON		Noxafil suspension buvable 40 mg/mL Attention posologie différente entre les 2 formes galéniques Attention, les doses doivent être adaptées ! La biodisponibilité de la susp est plus faible que celle des cpr et est davantage influencée par la prise de nourriture. Lors du passage des cpr à la susp, la dose doit être augmentée pour éviter un sousdosage	Pendant ou en dehors des repas
PRADAXA 75 mg 	1.044.904	gélule à libération modifiée	Dabigatran			Non	NON	Ouverture de la gélule entraîne une augmentation de 75% de la concentration plasmatique du Dabigatran donc augmentation du risque de saignement Le laboratoire conseille de switcher vers une autre molécule plutôt que d'ouvrir la gélule	Xarelto (comprimé écrasable) ou Eliquis (comprimé écrasable) ou Sintrom ou HBPM	Pendant ou en dehors des repas
PRADAXA 110 mg 	1.044.905									
PRADAXA 150 mg 	1.051.319									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
PRAMIPEXOLE TEVA 0,18 mg	1.084.449	comprimé	Pramipexole	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas	
PRAVASTATINE EG 20 mg	1.071.744	comprimé sécable	Pravastatine sodique	Oui	Oui		OUI			De préférence le soir pendant ou en dehors des repas	
PRAVASTATINE EG 40 mg	1.013.020										
PRAVIDEL 2,5 mg	0.001.082	comprimé sécable	Bromocriptine	Oui	Oui		OUI			Pas de données	
PRAXILENE 200 mg	0.001.086	comprimé pelliculé gastro-résistant	Naftidrofuryl oxalate	Non	Non		NON			Pendant les repas	
PREDNISON GALEN 5 mg	1.072.304	comprimé	Prednisone		Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pendant les repas	
PREDNISON GALEN 20 mg	1.076.014										
PREZISTA 600 mg	1.048.637	comprimé pelliculé	Darunavir		Oui		OUI		Prezista sirop 100 mg/mL	30 min après un repas (en association avec le Ritonavir (Norvir))	
PREZISTA 800 mg	1.054.087										
PRIMPERAN 10 mg	0.001.098	comprimé sécable	Métoclopramide chlorhydrate anhydre	Oui	Oui		OUI		Primperan solution buvable 1 mg/mL	Avant les repas	
PROBENECID Biokanol 500 mg	1.032.723	comprimé	Probenecid		Oui		OUI			Pendant un repas	
PROCORALAN 5 mg	1.041.036	comprimé sécable	Ivabradine	Oui	Oui		OUI			En 2 prises quotidiennes matin et soir	
PROGRAFT 0,5 mg	1.038.614	gélule	Tacrolimus			Oui Avec masque et gants	OUI	Ne pas utiliser de sonde en PVC		A prendre à jeun, 1 h avant ou 2 h après un repas	
PROGRAFT 1 mg	1.028.161										
PROLOPA HSB 125 mg	0.001.106	gélule HSB = gélule à libération prolongée	Bensérázide + Lévodopa	Oui	Non		NON		PROLOPA 125 mg cp dispersible	30 minutes avant ou 1 h après le repas	
PROLOPA DISPERSIBLE 125 mg	1.019.675	comprimé dispersible sécable									
PROLOPA 250 mg	0.001.108	comprimé quadrisécable									
PROSCAR 5 mg	1.019.074	comprimé pelliculé	Finastéride		Oui Avec masque et gants		OUI	A utiliser immédiatement car sensible à la lumière Ne pas faire manipuler les femmes		Pendant ou en dehors des repas	
PROSTIN E2 0,5 mg	0.001.115	comprimé	Dinoprostone		Non		NON			Pas de données	
PYRIDOXINE 250 mg	0.001.128	comprimé sécable	Pyridoxine chlorhydrate	Oui	Oui		OUI			Pas de données	

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
QUESTRAN 4 g	0.001.129	Sachet	Colestyramine				OUI	Verser un sachet dans 120-180 mL d'eau ou de jus de fruit et laisser		Pendant ou en dehors des repas (de préférence pendant les repas)
QUINIMAX 500 mg	1.047.193	comprimé pelliculé sécable	Alcaloïde de quinine base	Oui	Oui		OUI	Principe actif très très amer		Pas de données
RAMIPRIL EG 2,5 mg	1.054.978	comprimé sécable	Ramipril	Oui	Oui		OUI			Avant, pendant ou après le repas
RAPAMUNE 1 mg	1.048.834	comprimé pelliculé	Sirolimus	Non	Non		NON		Rapamune sol buvable 1 mg/mL (contient 20 mg d'éthanol et 20 mg d'huile de soja par mL)	Pendant ou en dehors des repas mais toujours à la même heure et dans les mêmes conditions
RAPAMUNE 2 mg	1.039.880									
RASILEZ 150 mg	1.041.473	comprimé pelliculé	Aliskirène	Non	Oui		OUI			A prendre avec un repas léger
RASILEZ 300 mg	1.041.931									
REBETOL 200 mg	1.030.362	gélule	Ribavirine			Non	NON		Rebetol sol buvable 40 mg/mL	Pendant les repas
REDOMEX 10 mg	0.001.142	comprimé pelliculé	Amitriptyline	Non	Oui		OUI	Risque irritation gastrique et goût métallique désagréable		Prise de préférence le soir
REDOMEX 25 mg	0.001.143									
REMERGON SOLTAB 15 mg	1.028.436	comprimé orodispersible	Mirtazapine	Non	Non		OUI	Comprimé fond dans la bouche ou le dissoudre dans un peu d'eau Utiliser la spécialité Mirtazapin Ratio 15 mg comprimé pour les doses de 7,5 mg (sur ordonnance)		Pendant ou en dehors des repas
REMERGON SOLTAB 30MG	1.012.939									
REVELA 800 mg	1.047.577	comprimé pelliculé	Sevelamer carbonate	Non	Non		NON		Renvela sachet 2,4 g à diluer dans 60 ml eau (obtention d'une solution)	Avec les repas
REQUIP 0,25 mg	1.019.781	comprimé pelliculé	Ropinirole chlorhydrate	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement Mélanger à un jus de fruit (=acide) car principe actif instable à pH > 8		Pendant les repas
REQUIP 1 mg	1.019.537									
REQUIP 2 mg	1.019.654									
RESCUVOLIN 15 mg 	1.035.971	comprimé sécable	Acide folinique	Oui	Oui		OUI			1 h avant ou 1 h après les repas
RETROVIR 250 MG	1.057.938	gélule	Zidovudine			Oui	OUI		Retrovir sol buvable 10 mg/mL	Pas de données
RETROVIR 300 mg	0.001.156	comprimé pelliculé sécable		Oui	Oui	Avec masque et				
REVATIO 20 mg	1.035.866	comprimé pelliculé	Sildénafil	Oui	Oui		OUI			Avec ou sans nourriture
REVLIMID 2,5 mg	1 062 532	gélule	Lénalidomide				Non	NON		Au cours ou en dehors d'un repas
REVLIMID 5 mg	1.042.272									
REVLIMID 7,5 mg	1.059.307									
REVLIMID 10 mg	1.044.631									
REVLIMID 15 mg	1.039.274									
REVLIMID 20 mg	1.059.323									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
REVLIMID 25 mg	1.037.563									
REVLAD 25 mg	1.047.863	comprimé pelliculé	Eltrombopag olamine	Non	Oui		OUI			4 h avant ou 4 h après la prise de produit laitiers, antiacides ou compléments en minéraux Les aliments pauvres en calcium
REVLAD 50 mg	1.047.391									
REYATAZ 150 mg	1.029.542	gélule	Atazanavir sulfate			Oui	OUI			Pendant les repas
REYATAZ 200 mg	1.029.543									
REYATAZ 300 mg	1.044.510									
REZOLSTAT 800/150 mg	1.059.234	comprimé pelliculé	Darunavir - Cobicistat		Oui		OUI			A prendre 30 minutes APRES avoir manger
RIAMET 20 mg/120 mg	1.082.050	comprimé	Artéméter - Luméfantrine	Non	Oui Avec masque et		OUI			Avec des aliments ou une boisson lactée
RIFADINE 300 mg	 0.001.160	gélule	Rifampicine			Oui Avec masque et gants	OUI		Rifadine sirop 20 mg/mL	30 minutes AVANT ou 2 heures APRES un repas
RILUTEK 50 mg	1.040.776	comprimé pelliculé	Riluzole		Oui		OUI			Pas de données
RIOPAN 800 mg	1.023.938	Sachet	Magaldrate				OUI	Suspension buvable prête à l'emploi		1 h voir 3 h après les repas voir 1 sachet au coucher
RILATINE 10 mg	 1.056.308	comprimé	Methylphenidate HCL	Oui	Oui		OUI			Pas de données
RISPERDAL 1 mg	0.001.166	comprimé pelliculé sécable	Risperidone	Oui	Oui		OUI		Risperdal sol buvable 1 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas
RISPERDAL 2 mg	0.001.167									
RISPERDAL 3 mg	0.001.168									
RIVOTRIL 0,5 mg	0.001.171	comprimé sécable	Clonazepam	Oui	Oui		OUI		Rivotril gouttes 2,5 mg/mL 1 mL = 25 gouttes = 2,5 mg	Pas de données
RIVOTRIL 2 mg	0.001.169	comprimé quadrisécable								
ROCALTROL 0,25 µg	0.001.174	capsule molle	Calcitriol				NON	Ne pas piquer dans la capsule car excipient huileux et photosensible		Pas de données
ROCALTROL 0,5 µg	0.001.175									
ROSUVASTATINE EG 10 mg		comprimé pelliculé	Rosuvastatine	Non	Oui		OUI			Avec ou sans nourriture
RYDAPT 25 mg	1.068.660	capsule molle	Midostaurine				NON			Pendant les repas
RYTMONORM 150 mg	0.001.186	comprimé enrobé	Propafenone chlorhydrate	Non	Oui		OUI	Enrobage car principe actif attaque la muqueuse gastrique Goût métallique désagréable		Après les repas
RYTMONORM 300 mg	0.001.187	comprimé enrobé sécable		Oui						
SABRIL 500 mg	1.051.536	sachet	Vigabatrine							Avant ou après les repas
SABRIL 500 mg	1.039.199	comprimé pelliculé sécable		Oui	Oui		OUI	Sabril 500 mg sachet		

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché				REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale			
SAMSCA 15 mg	1.052.103	comprimé	Tolvaptan		Oui		OUI			De préférence le matin pendant ou en dehors du repas
SAMSCA 30 mg	1.052.364									
SELOKEN 100 mg	0.001.209	comprimé sécable	Métoprolol	Oui	Oui		OUI			Toujours au même moment et dans les mêmes conditions
SERLAIN 50 mg	0.001.216	comprimé pelliculé sécable	Sertraline	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
SERLAIN 100 mg	1.030.239	comprimé pelliculé								
SEROQUEL 25 mg	1.012.941	comprimé pelliculé	Quétiapine	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
SEROQUEL 100 mg	1.012.942									
SEROQUEL 200 mg	1.012.943									
SEROQUEL 300 mg	1.027.774									
SEROQUEL XR 50MG	1.045.014	comprimé à libération prolongée		Non	Non		NON		Seroquel 25, 100, 200, 300 mg Répartir la dose des comprimés XR en 2 prises identiques	
SEROQUEL XR 200MG	1.046.624									
SEROQUEL XR 300MG	1.045.925									
SEROQUEL XR 400MG	1.044.697									
SIMVASTATIN EG 20 mg	1.055.021	comprimé pelliculé sécable	Simvastatine	Oui	Oui		OUI			A prendre le soir
SINEMET LP 25/100 mg	1.042.651	comprimé à libération prolongée	Carbidopa - Levodopa	Non	Non		NON		Sinemet comprimé à libération immédiate	Pas de données
SINEMET LP 50/200 mg	1.052.413									
SINEMET 25/250 mg	0.001.218	comprimé		Oui	Oui		OUI			
SINEMET 100/10 mg	1.038.604									
SINEQUAN 25 mg	0.001.221	gélule	Doxepine			Oui	OUI			Pas de données
SINEQUAN 50 mg	0.001.222									
SINGULAIR 10 mg	1.019.641	comprimé pelliculé	Montelukast	Non	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Administration le soir
SINTROM 1 mg	0.001.225	comprimé	Acenocoumarol	Oui	Oui		OUI	Attention au risque d'imprécision de dosage		Administration en une seule prise toujours au même moment de la
SIRDALUD 4 mg	1.034.402	comprimé	Tizanidine	Oui	Oui		OUI			Pas de données
SMECTA	1.014.218	sachet	Diosmectite				OUI	Dissoudre la poudre dans de l'eau		A distance des repas
SOLIAN 50 mg	1.019.911	comprimé	Amisulpride	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
SOLIAN 200 mg	1.020.008	comprimé sécable		Oui						

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
SOTALEX 160 mg	0.001.241	comprimé pelliculé sécable	Sotalol chlorhydrate	Oui	Oui		OUI			En dehors des repas	
SOVALDI 400 mg	1.055.721	comprimé pelliculé	Sofosbuvir	Oui	Oui		OUI	Enrobage sert à masquer un goût très amer		Avec de la nourriture	
SPASMOLYT 20 mg	1.019.276	dragée	Trosipium		Oui		OUI			A jeun avant le repas	
SPIRONOLACTONE EG 25 mg	1.067.141	comprimé sécable	Spironolactone	Oui	Oui		OUI	Insoluble dans l'eau, à mélanger dans du sirop ou avec des aliments		Pas de données	
SPIRONOLACTONE EG 100 mg	0.000.029										
SPORANOX 100 mg	0.001.251	gélule contenant des microbilles gastrorésistantes	Itraconazole			Oui Sans écraser les microbilles	OUI		Sporanox sirop 10 mg/mL	Immédiatement après un repas en une prise par jour	
SPRYCEL 20 mg	1.053.243	comprimé pelliculé	Dasatinib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas	
SPRYCEL 50 mg	1.039.093										
SPRYCEL 70 mg	1.036.101										
SPRYCEL 100 mg	1.045.837										
STABLON 12,5MG	1.018.677	comprimé enrobé	Tianeptine	Oui	Oui		OUI			Au début du repas	
STAPHYCID 500 mg	1.029.546	gélule	Flucloxacilline			Oui Avec masque et gants	OUI	A prendre avec un grand verre d'eau. Ne pas s'allonger directement après avoir pris les gélules		1 heure avant ou 2 heures après les repas	
STALEVO 50/12,5/200 mg	1.042.141	comprimé pelliculé	Lévodopa - carbidopa - entecapone	Non	Oui		OUI	Attention présence de colorants qui peuvent tacher les vêtements lors de l'écrasement des comprimés Ne pas dissoudre la poudre avec de l'eau		Pendant ou en dehors des repas	
STALEVO 100/25/200 mg	1.041.619										
STIVARGA 40 mg	1.054.581	comprimé pelliculé	Regorafenib		Non		NON			Prise après un repas léger à faible teneur lipidique	
STOCRIN 200 mg	1.009.644	comprimé pelliculé	Efavirenz		Oui		OUI			A jeun	
STOCRIN 600 mg	1.016.360										
STRESAM 50MG	1.034.242	gélule	Etifoxine			Oui	OUI			Pas de données	
STRIBILD 150/150/200/245 mg	1.053.866	comprimé pelliculé	Eivitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil fumarate	Non	Oui		OUI			Avec de la nourriture	
SUBOXONE 2/0,5 mg	1.042.243	comprimé sublingual	Buprenorphine + Naloxone	Non	Non		NON	Le comprimé doit être maintenu sous la langue jusqu'à sa dissolution complète		Les patients ne doivent pas avaler ou consommer des aliments ou des boissons avant la dissolution complète du comprimé	
SUBOXONE 8/2 mg	1.041.990										
SULFARLEM S 25 mg	0.001.264	comprimé enrobé	Anetholtrithione		Oui		OUI			30 minutes avant les repas	
SUTENT 12,5 mg	1.042.592										

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
SUTENT 25 mg	1.042.591	gélule	Sunitinib			Non	NON			Au cours ou en dehors des repas	
SUTENT 50 mg	1.054.998										
SYM TUZA 800/150/200/10 mg	1.066.776	comprimé pelliculé	Darunavir - Cobicistat - Emtricitabine - Tenofovir	Non	Oui		OUI			Avec de la nourriture	
TAFINLAR 50 mg	1 072 641	gélule	Dabrafenib			Non	NON			1 h avant ou 2 h après un repas	
TAFINLAR 75 mg	1.055.533										
TAGRISSO 40 mg	1 061 647	comprimé pelliculé	Osimertinib	Non	Non		OUI	Disperse le comprimé dans 50 ml d'eau non gazeuse et rincer le contenant avec la même quantité. SI SNG. idem ci-dessus mais avec 2 x		Pas de données	
TAGRISSO 80 mg	1 061 648										
TAMBOCOR 100 mg	0.001.285	comprimé sécable	Flécaïnide acétate	Oui	Oui		OUI			Pas de données	
TAMIFLU 30 mg	1 066 651	gélule	Oseltamivir			Oui	OUI		Tamiflu sirop 6 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas	
TAMIFLU 75 mg	1.016.273										
TAMOXIFEN Hexal 20 mg	1.041.755	comprimé	Tamoxifene		Oui Avec masque et gants		OUI	Mettre en suspension immédiatement la poudre Ne pas faire manipuler les femmes		Pas de données	
TAMSULOSINE Ratiopharm 0,4 mg	1.037.471	gélule à libération modifiée	Tamsulosine			Oui Sans écraser les microgranules	OUI			Après le petit-déjeuner ou 1er repas de la journée	
TARCEVA 25 mg	1.044.382	comprimé pelliculé	Erlotinib	Non	Non		OUI	Dissoudre les comprimés dans 100 mL d'eau Rincer 2 fois le récipient avec 40 mL d'eau à chaque fois Ne pas faire manipuler les femmes enceintes		1 heure avant ou 2 heures après un repas Sonde : Interrompre la nutrition entérale au moins 30 min avant et après l'administration	
TARCEVA 100 mg	1.039.627										
TARCEVA 150 mg	1.042.173										
TARGAXAN 550 mg	1.056.235	comprimé pelliculé	Rifaximine	Non	Oui		OUI				
TARGINACT 5/2,5 mg	1.048.812	Comprimé pelliculé à libération prolongée	Oxycodone chlorhydrate + Naloxone chlorhydrate	Non	Non		NON	Perte de l'effet retard	Oxynorm instant en répartissant les prises sur 24 h ou Oxynorm par voie injectable ou autre morphinique	Avec ou sans nourriture	
TARGINACT 10/5 mg	1.048.813										
TARGINACT 20/10 mg	1.048.906										
TARGRETIN 75 mg	1.049.039	capsule molle	Bexarotène				NON	Ne pas piquer dans la capsule		Avec un repas	






Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché								
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS		
TASIGNA 150 mg	1.048.567	gélule	Nilotinib			Oui Avec masque et gants	NON	Les gélules peuvent être dispersées dans une cuillère à café de compote de pomme qui doit être avalé immédiatement Ne pas utiliser plus d'une cuillère à café et d'autres aliments que la		Au moins 1 h avant les repas ou 2 h après un repas		
TASIGNA 200 mg	1.043.558											
TAVANIC 500 mg	1.015.399	comprimé pelliculé sécable	Levofloxacine	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI			Pendant ou en dehors des repas		
TEBRAZID 500 mg	0.001.299	comprimé	Pyrazinamide	Oui	Oui Avec masque et gants		OUI			Pas de données		
TEGRETOL 200 mg	1.051.688	comprimé sécable	Carbamazépine	Oui	Oui		OUI		Tegretol 2% (20 mg/mL) sirop	Pendant ou après les repas		
TEGRETOL CR 200 mg	1.051.689	comprimé sécable à libération prolongée									Non	NON
TEGRETOL CR 400 mg	1.051.700											
TELZIR 700 mg	1.029.642	comprimé pelliculé	Fosamprenavir calcique	Non	Oui Avec masque et gants		OUI		Telzir sol buvable 50 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas		
TEMESTA 1 mg	0.001.311	comprimé sécable	Lorazepam	Oui	Oui		OUI	Le comprimé fond directement sur la langue ou le disperser dans un peu d'eau	Temesta Expidet	Pas de données		
TEMESTA 2,5MG	0.001.312											
TEMESTA EXPIDET 1 mg	0.001.313	comprimé orodispersible		Oui	Non							
TEMESTA EXPIDET 2,5 mg	0.001.314											
TENORMIN 100 mg	0.001.318	comprimé	Atenolol	Oui	Oui		OUI			Pas de données		
TERALITHE 250 mg	1.067.692	comprimé sécable	Lithium carbonate	Oui	Oui		OUI			Dose à répartir en 3 prises au moment des repas		
TERALITHE LP 400 mg	1.057.020	comprimé à libération prolongée			Non	NON			Teralithe 250 mg Suivre la lithiémie	En une prise unique pendant le repas du soir		
TERCIAN 25 mg	1.015.226	comprimé pelliculé sécable	Cyamémazine tartrate	Oui	Oui		OUI		Tercian sol buvable 40 mg/mL	Pas de données		
TERCIAN 100 mg	1.034.149											
TEVETEN 600 mg	1.030.550	comprimé pelliculé	Eprosartan mésilate	Oui	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas		
TEYSUNO 15 MG	1.055.535	gélule	Tegafur - Giméracil - Otéracil			Non	NON			1 h avant ou 1 h après le repas		
TEYSUNO 20 mg	1.055.651											
THALIDOMIDE 50 mg	1.015.409	gélule	Thalidomide			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas De préférence le soir		
THEOLAIR LA 250 mg	0.001.329	comprimé sécable à libération prolongée	Théophylline micromisé	Oui	Non		NON		Xanthium 200 mg gélules (ouvrir la gélule et disperser les microgranules sans les broyer ou les	La nourriture influence l'absorption de la théophylline		

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
THERALENE 10 mg	1.030.535	comprimé pelliculé sécable	Alimemazine	Oui	Oui		OUI		Théralène gouttes 40 mg/mL (1 goutte = 1mg) (Attention: contient de l'éthanol)	Préférer la prise le soir ou au coucher
THYROZOL 10 mg	0.001.333	comprimé pelliculé sécable	Thiamazol	Oui	Oui		OUI			Pas de données
TIAPRIDAL 100 mg	0.001.337	comprimé quadrisécable	Tiapride chlorhydrate	Oui	Oui		OUI		Tiapridal gouttes (1 goutte = 5 mg) (attention : contient de l'éthanol)	Avant les repas
TILDIEM 60 mg	0.001.345	comprimé	Diltiazem chlorhydrate	Non	Oui		OUI		Tildiem 60 mg en répartissant la dose dans la journée	Pendant ou en dehors des repas
TILDIEM Retard 300 mg	0.001.346	gélule à libération prolongée				Oui Sans écraser les microbilles				
TILDIEM Retard 200 mg	1.019.247									
TIORFIX 100 mg	1.053.888	gélule	Racecadotril			Oui	NON	Risque de boucher la sonde La gélule peut être ouverte pour		Avant les repas
TIVICAY 50 mg	1.056.492	comprimé pelliculé	Dolutegravir		Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas
TOPAMAX 15 mg	1.044.500	gélule	Topiramate			Oui	OUI			Pendant ou en dehors des repas
TOPAMAX 25 mg	1.019.762	comprimé	Topiramate		Oui		OUI	Très amer Possibilité de faire dissoudre le comprimé dans une seringue, il faut une concentration de 9,8 mg/mL sinon le produit n'est pas soluble		Pendant ou en dehors des repas
TOPAMAX 50 mg	1.019.592									
TOPAMAX 100 mg	1.019.666									
TOVIAZ 4 mg	1.042.139	comprimé à libération prolongée	Fesoferodine fumarate	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
TRACLEER 32 mg	1.052.323	comprimé quadrisécable orodispersible	Bosentan	Oui (en 4)	Non		OUI	Le comprimé dispersible sera dissout dans une cuillère contenant un peu d'eau. La cuillère d'eau sera bien agitée pour faciliter le mélange avant d'être avalé. Une petite quantité d'eau supplémentaire doit être ajoutée ensuite à la cuillère pour la rincer et sera avalée par le patient. Il est		Pendant ou en dehors des repas
TRACLEER 62,5 mg	1.031.151	comprimé pelliculé		Non	Oui					
TRACLEER 125 mg	1.031.153									
TRADONAL 50 mg	1.055.003	gélule	Tramadol				NON		Tramal goutte 100 mg/mL (1 goutte = 2,5 mg)	Pendant ou en dehors des repas
TRADONAL Retard 100 mg	1.029.705	gélule à libération prolongée			Non					
TRADONAL Retard 150 mg	1.059.530									
TRAJENTA 5 mg	1.052.046	comprimé pelliculé	Linagliptine	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
TRANDATE 100 mg	0.001.364	comprimé pelliculé	Labétolol chlorhydrate	Non	Oui		OUI			Pendant les repas	
TRANXENE 5 mg	0.001.370	gélule	Clorzepate dipotassique			Oui	OUI			Pas de données	
TRANXENE 10 mg	0.001.369										
TRANXENE 50 mg	0.001.368	comprimé pelliculé sécable		Oui	Non		NON		Tranxène 5 et 10 mg élule		
TRAZODONE EG 100 mg	0.059.918	comprimé quadrisécable	Trazodone chlorhydrate	Oui (en 4)	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif très sensible à la lumière et l'humidité de l'air		A prendre directement après un repas	
TRECTOR 250 mg	1.060.272	comprimé	Ethionamide	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas	
TRIENTINE 2HCL 300 mg	1.030.638	gélule	Trientine dihydrochloride			Non	NON			Pas de données	
TRIVASTAL LP 50 mg	0.001.379	comprimé à libération prolongée	Piribédil		Non		NON		Autre agoniste dopaminergique	En fin de repas	
TRIUMEQ 50/600/300 mg	1.058.394	comprimé pelliculé	Dolutegravir - Abacavir - Lamivudine	Non	Oui	Avec masque et lunettes	OUI			Avec ou sans nourriture	
TRIZIVIR	1.013.120	comprimé pelliculé	Abacavir sulfate + Zidovudine + Lamivudine		Oui		OUI		3 molécules séparément en solution buvable : Ziagen 20 mg/mL + Retrovir 10 mg/mL + Epivir 10 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas	
TUKYSA 50 mg	1 080 208	comprimé pelliculé	Tucatinib	Non	Non		NON	Peut-être pris en même temps que le capécitabine		Pendant ou en dehors des repas	
TUKYSA 150 mg	1 078 196										
TYVERB 250 mg	1.040.482	comprimé pelliculé	Lapatinib	Non	Non		OUI	Les comprimés peuvent être dissouts dans l'eau		1 h avant ou 1 h après un repas	
ULTRA-MG 162 mg	0.001.389	sachet	Magnésium gluconate				OUI	Dissoudre la poudre dans de l'eau		En dehors des repas	
UPTRAVI 200 ug	1 070 658	comprimé pelliculé	Sélexipag	Non	Non		NON			Pendant les repas Si augmentation des doses, conseiller de le faire lors de la prise du soir	
UPTRAVI 400 ug	1 070 958										
UPTRAVI 600 ug	1 067 979										
UPTRAVI 800 ug	1 064 311										
UPTRAVI 1000 ug	1 069 252										
UPTRAVI 1200 ug	1 066 980										
UPTRAVI 1400 ug	1 064 649										
UPTRAVI 1600 ug	1 064 578										
URSOFALK 250 mg	1.019.274	gélule	Acide ursodeoxycholique			Oui	OUI		Ursolfalk suspension	Pendant les repas	


Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
UTROGESTAN 100 mg	0.001.413	capsule molle	Progestérone naturelle micronisée	Non	Non	Non	NON	Contenu huileux Ne pas piquer la capsule	Administration vaginale	Pas de données	
VALCYTE 450 mg 	1.015.465	comprimé pelliculé	Valganciclovir chlorhydrate	Non	Non		NON		Valcyte sirop 50 mg/mL ou Cymeven injectable	Pendant un repas	
VALIUM 5 mg	0.001.420	comprimé sécable	Diazepam	Oui	Oui		OUI			Pas de données	
VALIUM 10 mg	0.001.419										
VANCOMYCINE ENTEROCAPS 125 mg	1 074 225	gélule	Vancomycine				NON		Utiliser flacon injectable à 500 mg. Reconstitution avec 10 mL eau: Ne pas conserver le flacon. Prendre un nouveau flacon pour chaque administration.	Pas de données	
VANCOMYCIN ENTEROCAPS 250 mg	1.074.107										
VARGATEF 100 mg	1.058.619	capsule molle	Nintedanib				NON			Avec de la nourriture	
VENCLYXTO 10 mg	1 066 243	comprimé pelliculé	Vénétoclax	Non	Non		NON	Ne pas administrer avec des produits à base de pamplemousse, d'oranges amères et de carambole		Au cours du repas (pour éviter une diminution de l'efficacité)	
VENCLYXTO 50 mg	1 066 565										
VENCLYXTO 100 mg	1.066.564 1.070.917										
VERZENIOS 50 mg	1 078 536	comprimé pelliculé	Abémaciclib	Non	Non		NON	Ne pas administrer avec du pamplemousse ou du jus de pamplemousse		Pendant ou en dehors des repas	
VERZENIOS 100 mg	1 078 537										
VERZENIOS 150 mg	1 078 538										
VESANOID 10 mg	1.005.854	capsule molle	Trétinoïne				OUI	Ne pas piquer dans la capsule, mettre la capsule dans une seringue de 50		Pendant ou à la fin d'un repas	
VFEND 50 mg	1.040.480	comprimé pelliculé	Voriconazole	Non	Oui Avec masque et gants		OUI	Sonde : Interrompre la nutrition entérale pendant au moins 30 min avant et après l'administration	Vfend suspension orale 40 mg/mL ou Vfend 200 mg IV	1 heure avant ou 1 heure après un repas	
VFEND 200 mg	1.015.463										
VICTRELIS 200 mg	1.049.385	gélule	Bocéprévir			Oui Avec masque et gants	NON			Avec de la nourriture	
VIDEX EC 250 mg	1.010.948	gélule gastro-résistante	Didanosine				NON		Videx poudre pour suspension orale 2 g pour 200 mL	A jeun, au moins 1 h avant ou 2 h après un repas	
VIDEX EC 400 mg	1.010.539										

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
VIEKIRAX 12,5/75/50 mg	1.058.602	comprimé pelliculé	Ombitasvir - Paritaprevir - Ritonavir	Non	Non		NON			Avec de la nourriture
VIMPAT 100 mg	1.043.153	comprimé pelliculé	Lacosamide	Non	Oui		OUI		Vimpat sirop 10 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas
VIRAMUNE 200 mg	1.005.878	comprimé	Névirapine anhydre	Non	Oui		OUI		Viramune suspension buvable 10 mg/mL (administration en 2 prises par jour)	Avec ou sans nourriture
VIRAMUNE LP 400 mg	1.051.567	comprimé à libération prolongée			Non	NON				
VIREAD 245 mg	1.015.628	comprimé pelliculé	Ténofovir disproxil fumarate	Non	Non		OUI	Dissoudre le comprimé dans 100 ml eau ou du jus d'orange (20 min) Administration immédiate		Pendant un repas
VITAMINE B2 Jenapharm 10 mg	1.049.618	comprimé sécable	Riboflavine	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Pas de données
VORICONAZOLE TEVA 200 mg	1.066.450	comprimé pelliculé	Voriconazole	Non	Oui Avec masque et gants		OUI	Sonde : Interrompre la nutrition entérale pendant au moins 30 min avant et après l'administration	Vfend suspension orale 40 mg/mL ou Voriconazole Teva 200 mg IV	1 heure avant ou 1 heure après un repas
VOLIBRIS 5 mg	1.042.144	comprimé pelliculé	Ambrisentan	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
VOTRIENT 200 mg	1.047.316	comprimé pelliculé	Pazopanib	Non	Non		NON			1 heure avant ou 2 heures après un repas
VOTRIENT 400 mg	1.046.949									
VOTUBIA 2,5 mg	1.054.752	comprimé	Everolimus	Non	Non		OUI	Les comprimés peuvent être dissouts dans 30 mL d'eau en agitant doucement		Avec ou sans nourriture
VOSEVI 400/100/100 mg	1 069 393	comprimé pelliculé	Sofosbuvir - Velpatasvir - Voxilaprévir	Non	Non		NON			Pendant le repas
YNDAQEL 20 mg	1.061.088	capsule molle	Tafamidis	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
YNDAQEL 61 mg	1 075 869									
WAKIX 4,5 mg	1 067 794	comprimé pelliculé	Pitolisant	Non	Non		NON			Au cours du petit déjeuner (et avant midi)
WAKIX 18 mg	1 067 795									
WELLBUTRIN XR 150 mg	1.040.154	comprimé à libération prolongée	Bupropion	Non	Non		NON	Si on écrase le comprimé augmentation des effets indésirables y compris de convulsions		Pendant ou en dehors des repas
WELLBUTRIN XR 300 mg	1.040.523									

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	
XALKORI 250 mg	1.053.374	gélule	Crizotinib			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas	
XANAX 0,25MG	0.001.470	comprimé sécable	Alprazolam	Oui	Oui		OUI	Préférer alternative	Xanax solution buvable 0,75 mg/mL (1 goutte = 0,025mg) (attention: contient de l'éthanol)	Pas de données	
XANAX 0,5MG	0.001.471										
XANAX 1MG	0.001.472										
XANAX Retard 1 mg	1.018.877	comprimé à libération prolongée		Non	Non		NON				
XANTHIUM 200 mg	1.013.592	gélule à libération prolongée	Theophylline monohydrate			Oui Sans écraser les	OUI			La nourriture influence l'absorption de la théophylline	
XARELTO 2,5 mg	 1.071.438	comprimé pelliculé	Rivaroxaban	Non	Oui		OUI	Mélanger le comprimé broyé avec un peu d'eau ou de compote de pomme (à donner pendant un repas pour garantir une bonne absorption)		Pendant les repas	
XARELTO 10 mg	 1.051.439										
XARELTO 15 mg	 1.052.065										
XARELTO 20 mg	 1.052.278										
XELODA 500 MG	1.007.042	comprimé pelliculé	Capecitabine		Oui Avec masque, gants et blouse		OUI	ATTENTION PRODUITS CYTOSTATIQUES 1 comprimé à 500 mg peut être			
XOSPATA 40 mg	1 080 349	comprimé pelliculé	Giltéritinib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas	
ZALDIAR 37,5/325 mg	1.029.495	comprimé pelliculé	Tramadol + Paracetamol	Non	Oui		OUI			Pendant ou en dehors des repas	
ZANIDIP 10 mg	1.024.222	comprimé pelliculé	Lercanidipine	Oui	Oui		OUI			15 min avant le petit déjeuner	
ZEJULA 100 mg	1 067 405	gélule	Niraparib			Non	NON			Pendant ou en dehors des repas	
ZELBORAF 240 mg	1.051.105	comprimé pelliculé	Vemurafenib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas en 2 prises espacées de 12h	
ZELITREX 500 mg	 1.018.691	comprimé pelliculé	Valaciclovir	Non	Oui Avec masque et gants		OUI	Très amer		Pendant ou en dehors des repas	
ZENTEL 400 mg	1.028.442	comprimé pelliculé	Albendazole	Oui	Oui		OUI		Zentel suspension buvable 40 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas	
ZERIT 30 mg	0.001.491	gélule	Stavudine			Oui Avec masque et gants	OUI		Zerit sol buvable 1 mg/mL	A jeun au moins 1 h avant le repas	
ZERIT 40 mg	1.044.310										

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	Médicaments ancien marché						
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS
ZIAGEN 300 mg	1.010.701	comprimé pelliculé	Abacavir sulfate		Oui Avec masque et gants		OUI		Ziagen sol buvable 20 mg/ml	Pendant ou en dehors des repas
ZINNAT 500 mg	0.003.313	comprimé pelliculé	Céfuroxime axétil	Non	Oui Avec masque et gants		OUI	Goût très amer Préférer alternative	Zinnat granulés pour suspension buvable 50 mg/mL	15-30 min après un repas
ZITROMAX 250 mg	1.042.886	comprimé pelliculé	Azithromycine		Oui Avec masque et gants		OUI	Principe actif sensible à la lumière	Zithromax poudre pour suspension buvable 40 mg/mL	Pendant le repas
ZOLPIDEM EG 10 mg	1.049.504	comprimé pelliculé sécable	Zolpidem	Oui	Oui		OUI	A utiliser immédiatement car principe actif sensible à la lumière		Juste avant le coucher
ZONEGRAN 25 mg	1.038.232	gélule	Zonisamide			Oui	OUI	Non recommandé par la firme car ils n'ont pas fait d'études		Pendant ou en dehors des repas
ZOVIRAX 200 mg	0.001.509	comprimé	Aciclovir	Non	Oui Avec masque et gants		OUI		Zovirax suspension buvable 400 mg/5 mL	Pas de données
ZOVIRAX 800 mg	0.001.513			Oui						
ZYDELIG 150 mg	1 058 673	comprimé pelliculé	Idélalisib	Non	Non		NON			Pendant ou en dehors des repas
ZYPREXA VELOTAB 5 mg	1.012.948	comprimé orodispersible	Olanzapine		Non		OUI	Fond directement dans la bouche ou dissoudre le comprimé dans 30 mL d'eau ou de jus d'orange		Pendant ou en dehors des repas
ZYPREXA VELOTAB 10 mg	1.012.950									
ZYVOXID 600 mg	1.027.630	comprimé pelliculé	Linézolide	Non	Oui Avec masque et gants		OUI		Zyvoxid granulé pour suspension buvable 20 mg/mL	Pendant ou en dehors des repas

Recommandations de bon usage des broyeurs de comprimés



1. Placer le comprimé dans le godet à médicament étiqueté au nom du patient (R/3 : 1002403)
2. Placer le godet dans le socle du broyeur
3. Positionner le pilon dans le godet à médicament
4. Maintenir d'une main la protection sur le godet à médicament et faire des mouvements de haut en bas pour écraser le
5. Nettoyer le pilon avec une lingette Bacillol et laisser sécher (R/3 : 1011600) ou le nettoyer à l'eau et au savon et laisser

Cas d'un patient en isolement : commander sur ordonnance à la pharmacie un broyeur de comprimé en plastique qui sera

Antirétroviraux	Stupéfiants	Cytostatiques et immunosuppresseurs	Non-STOCK ou sur ordonnance	<i>Médicaments ancien marché</i>							
SPECIALITE	Article	FORME PHARMACEUTIQUE	PRINCIPE ACTIF	Couper	Ecraser	Ouvrir	Sonde entérale	REMARQUE EXPLICATION	ALTERNATIVE A FAIRE VALIDER PAR LE MEDECIN	REPAS	