

PATIENT TRAITÉ PAR UN IPP

Oméprazole (Losec®)


Esoméprazole (Nexiam®)

Lansoprazole (Dakar®)


Pantoprazole (Pantomed®)

Rabéprazole (Pariet®)

POURQUOI ?



POURSUIVRE LE TRAITEMENT




L'IPP est à prendre au minimum 30 minutes avant le premier repas de la journée. Chez les patients présentant des symptômes nocturnes, une dose le soir, avant le dîner, peut être efficace.

À l'entrée et à la sortie de l'hôpital, remettre systématiquement en question la nécessité de poursuivre le traitement.

DÉPRESCRIPTION RECOMMANDÉE

en collaboration avec le médecin traitant et le pharmacien **⚠️ Courrier de sortie**



Si les symptômes sont toujours présents 3-7 jours après arrêt de l'IPP et interfèrent avec une activité normale :

- 1) Rechercher HP et traiter si nécessaire
- 2) Retour à la dose précédente
- 3) Nouvelle tentative de déprescription minimum 4 semaines après un traitement continu à la dose minimale efficace

RÉÉVALUER APRÈS 4 ET 12 SEMAINES (auprès du médecin traitant)

Dyspepsie / Perte de poids / Régurgitation / Douleur épigastrique / Perte d'appétit / Brûlure d'estomac / Pyrosis